

CLAVICORNES NOUVEAUX

DES INDES ORIENTALES ET PAYS VOISINS

PAR A. GROUVELLE

NITIDULIDAE

1. **Colastus Modiglianii**, n. sp. — *Oblongus, sat latus, subconvexus, subnitidus, flavo-pubescent, dense punctatus, nigro-brunneus: singulo elytro juxta suturam testaceo maculato; prothorace valde transverso, antice angustato, angulis anticis posticisque rotundatis; elytris haud punctato-lineatis.* — Long. 3 mill.

Oblong, assez large, peu convexe, peu brillant, couvert d'une pubescence flave, serrée, densément ponctué, brun foncé tirant un peu sur le rougeâtre, plus clair sur le devant de la tête, les côtés du prothorax et l'extrémité de l'abdomen. Prothorax très transversal, fortement rétréci au sommet, à peine à la base, tous les angles arrondis. Ecusson largement arrondi au sommet. Elytres un peu moins longs que larges ensemble, confusément ponctués, chacun avec une grande tache oblongue bordant presque la suture. Antennes, sauf la massue, et pattes d'un testacé jaunâtre. Dessous moins foncé que le dessus, densément ponctué.

Sumatra (Si-Rambé). E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gênes.

2. **Brachypeplus hispidulus**, n. sp. — *Oblongo-elongatus, vix convexus, subnitidus, setis brevibus, cinereis hispidulus, nigro-piceus; lateribus prothoracis elytrorumque plus minusve rufescentibus; antennis*

clava excepta pedibusque rufis; prothorace transverso, dense grosseque punctato, angulīs anticis late rotundatis; scutello transverso, lateribus parallelis; elytris punctato-striatis, intervallis striatis, striis externis intus sinuatis. — Long. 3 mill. $\frac{1}{2}$.

Allongé, oblong, à peine convexe, peu brillant surtout sur les élytres, couvert d'une pubescence grise, formée de petits poils squamiformes, assez écartés, disposés en lignes sur les élytres, brun noir, rougeâtre sur les côtés du prothorax et le bord des élytres. Antennes sauf la massue et pattes rougeâtres. Tête densément ponctuée, angles postérieurs aigus. Prothorax plus de deux fois plus large que long, parallèle à la base, largement arrondi aux angles antérieurs, couvert d'une grosse ponctuation superficielle et très serrée; marge antérieure presque droite, rebordée de chaque côté, marge basilaire entièrement rebordée, côtés non rebordés, explanés. Prothorax parallèle à la base, largement arrondi au sommet. Elytres environ aussi longs que larges ensemble, ponctués striés, stries externes sinuées en dedans; intervalles très étroits; points des stries gros très serrés. Abdomen finement et densément pointillé; segments finement bordés de rougeâtre au sommet.

Sumatra. Collections du Musée Civique de Gênes, A. Fry et A. Grouvelle.

3. *Brachypeplus (Selis) dorsalis*, n. sp. — *Elongatus, oblongo-ovatus, subdepressus, subopacus, punctatus, flavo-pubescent, laete rufo-testaceus; fronte nigricante, sutura, apice, lateribusque elytrorum, discoque ultimorum segmentorum abdominis infuscatis; elytris costatis.* — Long. 4 mill.

Allongé, oblong, très faiblement convexe, peu brillant, assez densément ponctué, couvert d'une pubescence flave peu serrée, testacé un peu ferrugineux. Front, élytres, sauf une large bande longitudinale sur le disque, n'atteignant pas le sommet et disque des deux derniers segments de l'abdomen enfumés. Prothorax plus de deux fois plus large à la base que long, subparallèle à la base, rétréci au sommet; côtés étroitement relevés, plus largement à la base. Ecusson subpentagonal. Elytres environ aussi larges que longs ensemble, intervalles subcosti-

formes ou plutôt paraissant légèrement relevés en raison de la présence d'une ligne pubescente.

Sumatra (Siboga). E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gênes.

4. **Brachypeplus mixtus**, n. sp. — *Oblongo-elongatus*, modice convexus, nitidulus, glaber, piceus; prothorace, antennis clava excepta dilutiore; capite dense punctato, antice utrinque impresso; prothorace transverso, antice posticeque angustato, lateribus arcuato, punctato; scutello subsemicirculari; elytris striato-punctatis. — Long. 4 mill.

Oblong, allongé, un peu convexe, assez brillant, glabre, brun de poix; prothorax un peu plus clair que le reste du corps, tarsi et antennes sauf la massue rougeâtres. Tête transversale densément ponctuée, impressionnée de chaque côté, vers la naissance des antennes. Prothorax presque deux fois aussi large que long, un peu plus rétréci au sommet qu'à la base, arqué sur les côtés, plus densément et plus fortement ponctué que la tête, surtout sur les côtés; angles antérieurs et postérieurs arrondis, base rebordée, sauf dans le milieu. Ecusson presque en demi-ovale, avec quelques gros points peu serrés à la base. Elytres un peu plus longs que larges ensemble, assez fortement ponctués-striés. Segments abdominaux finement et assez densément ponctués, très étroitement bordés de roux.

Perak. Collections A. Fry et A. Grouvelle.

5. **Brachypeplus nitidulus**, n. sp. — *Elongatus*, parallelus, depressus, nitidulus, glaber, nigro-piceus; elytris basin versus late brunneo-testaceis: capite punctato: prothorace transverso, antice posticeque angustato, lateribus arcuato, punctato, disco in longitudinem vage impresso; elytris sat elongatis, oblique striato-punctatis. — Long. 4 mill.

Allongé, parallèle, déprimé, glabre, brillant, brun de poix sauf la base des élytres qui est largement plus claire. Tête assez densément ponctuée. Prothorax transversal, rétréci à la base et au sommet; bords latéraux arqués; angles antérieurs et postérieurs subarrondis; ponctuation assez forte, plus dense sur les côtés, disque obsolètement impressionné. Ecusson large,

triangulaire, présentant quelques points. Elytres environ une fois et un tiers aussi longs que larges ensemble, obliquement striés ponctués; strie suturale parallèle à la suture, se terminant vers la base, dans une série de points disposés irrégulièrement. Segments de l'abdomen ponctués, bordés de testacé, impressionnés de chaque côté contre la carène latérale.

Perak. Collections A. Fry et A. Grouvelle.

6. **Brachypeplus opacus**, n. sp. — *Elongatissimus, parallelus, vix convexus, opacus glaber, nigro-piceus; antennis tarsisque testaceis; capite dense fortiterque punctato; prothorace subquadrato, sat dense punctato, angulis omnibus rotundatis; elytris elongatis, multi-lineato-punctatis.* — Long. 5 mill.

Très allongé, parallèle, faiblement convexe, glabre, opaque, noirâtre; antennes et tarsi testacés. Tête transversale couverte de gros points un peu allongés. Prothorax subcarré, arrondi à tous les angles, finement réticulé, couvert d'une ponctuation un peu allongée, dense et assez forte; base rebordée sauf dans le milieu. Ecusson demi-circulaire ponctué de quelques gros points. Elytres environ une fois et demie aussi longs que larges, couverts de fines lignes ponctuées assez serrées. Abdomen finement pointillé, pygidium plus long que large.

Perak. Collection A. Fry.

7. **Brachypeplus nitidus**, n. sp. — *Elongatus, parallelus, vix convexus, nitidus, glaber, piceo-brunneus; capite prothoraceque parce punctatis; prothorace transverso; elytris subtiliter punctato-striatis, pedibus testaceis.* — Long. 3 mill. $\frac{1}{2}$.

Allongé, parallèle, à peine convexe, brillant, glabre, brun-marron; tête un peu rembrunie, pattes, marge antérieure de la tête et une étroite bordure au sommet des segments 2 à 4 de l'abdomen plus clairs. Tête et prothorax assez fortement et peu densément ponctués. Prothorax transversal, à peine plus large au sommet qu'à la base. Ecusson subtriangulaire, finement et éparsement ponctué. Elytres plus longs que larges ensemble, très finement ponctués en lignes; intervalles très larges; ponctuation effacée au sommet. Abdomen finement et éparsement pointillé.

Sumatra (Si-Rambé). E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gênes: (Deli) collection Grouvelle.

8. *Brachypeplus dimidiatus*, n. sp. — *Elongatus, parallelus, subconvexus, nitidus, glaber, piceus; elytris basin versus dilutioribus; capite convexo, antice bi-impreso, fortiter punctato; prothorace transverso, antice posticeque angustato, lateribus arcuatis, angulis omnibus rotundatis; elytris punctato-striatis.* — Long. 4 mill.

Allongé, parallèle, faiblement convexe, brillant, glabre, couleur de poix, élytres plus claires à la base. Tête convexe, bi-impressionnée en avant, fortement et peu densément ponctuée. Prothorax moins de deux fois plus large que long, rétréci à la base et au sommet, arqué sur les côtés; angles antérieurs et postérieurs arrondis, ponctuation peu serrée, moins forte que celle de la tête; strie marginale de la base interrompue au milieu. Ecusson subtriangulaire. Elytres une fois et un tiers aussi longs que larges ensemble, ponctués en lignes, faiblement striés. Abdomen peu densément ponctué.

Sumatra (Marang). Collection A. Fry.

TABLEAU DES *BRACHYPEPLUS* NON PUBESCENTS
DE LA RÉGION DES INDES ORIENTALES

1. Angles postérieurs de la tête aigus très marqués, forme assez large	<i>mixtus</i> Grouv.
» arrondis ou à peine marqués, forme allongée	2
2. Corps opaque; élytres couverts de lignes de points serrés	<i>opacus</i> Grouv.
» Corps brillants; élytres simplement striés ponctués ou ponctués en lignes avec des intervalles normaux.	3
3. Stries des élytres obliques par rapport à la suture.	<i>nitidulus</i> Grouv.
» Stries des élytres parallèles à la suture . . .	4
4. Elytres foncés concolores, à peine plus longs que larges ensemble	<i>nitidus</i> Grouv.
» Elytres plus clairs à la base, d'un tiers plus longs que larges ensemble	<i>dimidiatus</i> Grouv.

9. **Platynema Ritsemai**, n. sp. — *Elongata, parallela, nitida, glabra, fulvo-testacea; antennis, capite antice infuscatis; margine antico epistomatis late emarginato, medio exciso; capite parce punctulato in disco aliquot punctis fortiter impressis; prothorace oblongo, parce punctato, in longitudinem leviter sulcato; elytris punctato-striatis.* — Long. 7 mill.

Allongé, parallèle, brillant, glabre, d'un testacé un peu rougeâtre; antennes et partie antérieure de la tête rembrunies. Epistôme largement échancré, excisé au milieu. Tête oblongue, un peu plus longue que large, éparsément et fortement ponctuée sur le milieu du disque, éparsément et finement ponctuée sur toute la surface. Prothorax de la largeur de la tête, un peu plus long que large, oblong, éparsément ponctué et sillonné finement et longitudinalement sur le disque. Ecusson presque lisse, subtriangulaire. Elytres plus longs que larges ensemble, ponctués-striés. Abdomen et surtout dernier segment assez densément ponctués; marge apicale de ce dernier segment échancrée en demi cercle.

Sumatra (Deli). Collection Grouvelle.

10. **Cillaeus Modiglianii**, n. sp. — *Elongatus, parallelus, nitidus, glaber; capite prothoraceque rufo-testaceis, plus minusve subinfuscatis; elytris ochraceis, lateribus apiceque infuscatis, sat fortiter striato-punctatis; abdomine piceo, segmentis 2-5 ad apicem testaceo-marginatis.* — Long. 5 mill.

Allongé, parallèle, assez brillant, glabre. Massue des antennes brune. Tête densément et fortement ponctuée, d'un roux testacé un peu enfumé, marge antérieure, plus claire, testacé. Prothorax de la couleur de la tête, mais plus clair; plus large que long, densément et assez fortement ponctué surtout sur les côtés, presque lisse sur le milieu du disque. Ecusson subtriangulaire, brun de poix, assez fortement, mais éparsément ponctué. Elytres plus longs que larges ensemble, d'un testacé jaunâtre, bordés de brun au sommet et sur les côtés, fortement ponctués striés; intervalles à peine plus larges que les points; intervalle sutural plus large à la base, présentant dans cette partie, en dehors de la ligne ponctuée suturale un rudiment de ligne ponctuée interne et

quelques points. Abdomen brun de poix clair, sommets du 2.^{me} à 4.^{me} segments bordés de testacé. Pattes testacées, légèrement enfumées.

Sumatra (Si-Rambé). E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gènes.

11. *Cillaeus elongatissimus*, n. sp. — *Parallelus, filiformis, nitidulus, nigro-brunneus; antennis rufis, clava infuscata; capite ovato vix longiore quam latiore, dense grosseque punctato, epistomate reticulato; prothorace oblongo, tenue striolato, parce punctato; scutello triangulari; elytris elongatis, tenue striolatis, leviter punctato-striatis; abdomine parce fortiterque punctato, ultimo segmento apice rotundato, utrinque prope carinam lateralem subexcavato.* — Long. 5 mill.

Parallèle, filiforme, un peu brillant, noirâtre. Antennes courtes, rougeâtres, massue brune. Tête un peu plus longue que large, couverte d'une ponctuation grosse, profonde et serrée; epistome finement réticulé. Prothorax environ d'un tiers plus long que large, finement striolé, éparsément ponctué de points allongés; tous les angles arrondis. Ecusson triangulaire. Elytres plus de deux fois plus longs que larges ensemble, finement striolés, finement ponctué-striés. Partie découverte de l'abdomen sensiblement aussi longue que le reste du corps, finement réticulé, éparsément et assez fortement ponctué, disque des segments obsolètement carénés dans la longueur; dernier segment arrondi au sommet, subexcavé le long des carènes laterales. Dessous brillant très finement striolé, éparsément ponctué, metasternum excavé vers le sommet.

Sumatra (Si-Rambé). E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gènes.

Cette espèce a la massue antennaire, formée de deux articles dont le dernier est terminé par un bouton saillant. Peut être conviendrait-il de la séparer du genre *Cillaeus*. Les deux premiers segments de l'abdomen sont relativement courts par rapport aux suivants.

12. *Trimenus piceus*, n. sp. — *Oblongus, modice convexus, fere opacus, tenue pubescens, dense punctatus, piceus; prothorace trans-*

verso, angulis anticis rotundatis; elytris elongatis, truncatis; penultimo segmento abdominis in longitudinem subcarinato. — Long. 5 mill.

Oblong, un peu convexe, presque mat, très finement pubescent, densément ponctué, brun de poix. Antennes sauf la massue rougêtres. Tête impressionnée de chaque côté vers la naissance des antennes. Prothorax presque deux fois aussi large à la base que long, subparallèle à la base, rétréci au sommet, presque aussi fortement ponctué que la tête; angles antérieurs arrondis. Ecusson presque demi circulaire. Elytres de la largeur du prothorax à la base, environ une fois et un tiers aussi longs que larges ensemble, atténués vers le sommet, plus finement ponctués que le prothorax, tronqués. Avant dernier segment de l'abdomen subcaréné.

Sumatra (Palembang). Collection Grouvelle.

Pseudoischaena, n. gen.

Ultimum segmentum abdominis expositum; penultimum fere apertum.

Processus prosternalis latus, porrectus, ad apicem subtruncatus.

Mesosternum in longitudinem carinatum.

Labrum productum, profunde excisum.

Clava antennarum subhemispherica; sulci integri.

Tarsi simplices; unguiculi haud dentati.

Segmenti 2.° 3.° 4.° abdominis aequales.

Nouveau genre voisin comme forme générale des *Ischaena*, mais distinct par la saillie prosternale très développée. Ce genre vient faire la transition entre les *Ischaena* et les *Aethina*.

13. **Pseudoischaena longula**, n. sp. — *Elongata, modice convexa, subnitida, tenue pubescens, castanea, capite dense punctato, utrinque impresso; prothorace transverso, antice angustato, dense punctato; lateribus basin versus parallelis, angulis anticis rotundatis; scutello subtriangulari; elytris elongatis, dense punctulatis; pygidio elongato.* — Long. 3 mill.

Allongé, peu convexe, moyennement brillant surtout sur la tête et le prothorax, couvert d'une pubescence en général très

dense mais beaucoup plus développée sur la partie antérieure du prothorax (les exemplaires examinés sont-ils bien frais?), brun marron. Tête densément ponctuée, impressionnée de chaque côté vers la base des antennes. Prothorax beaucoup plus large que la tête, environ une fois et un tiers plus large que long, parallèle à la base, rétréci au sommet, densément ponctué; angles antérieurs arrondis. Ecusson en triangle curviligne, moins fortement ponctué que le prothorax. Elytres de la largeur à la base du prothorax, atténués vers le sommet, environ une fois et demie aussi longs que larges ensemble, tronqués, couverts d'une ponctuation dense, fine et un peu rapeuse; marge apicale étroitement bordée de rougeâtre. Pygidium un peu plus long que large, frangé de poils jaunes au sommet. Pattes d'un brun clair.

Sumatra (Si-Rambé). E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gênes. Perak. Collection A. Fry.

14. **Carpophilus (Urophorus) sanguinipennis**, n. sp. — *Oblongus, subconvexus, nūdus glaber, niger; elytris lateribus exceptis, rufis; capite prothoraceque sat dense punctatis; hoc transverso, antice angustato, basin versus subabrupte constricto, angulis anticis rotundatis, posticis acutis; scutello subpentagonali, punctato; elytris sat parce punctatis; antennis pedibusque rufis.* — Long. 3 mill. $\frac{1}{2}$.

Oblong, peu convexe, brillant, glabre, noir; antennes, pattes et élytres, sauf une bordure latérale peu large, rouges. Tête fortement et assez densément ponctuée; labre rouge. Prothorax étroitement bordé de rouge sur les côtés, assez densément ponctué, impressionné de chaque côté vers les angles postérieurs, environ deux fois aussi large à la base que long, angles antérieurs arrondis, postérieurs aigus, bords latéraux assez brusquement sinués vers les angles postérieurs. Ecusson subpentagonal, ponctué sur le disque. Elytres environ aussi longs que larges ensemble, anguleux aux épaules, atténués au sommet, obliquement tronqués, assez éparsement ponctués. Segments abdominaux assez densément ponctués.

Sumatra (Padang). E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gênes.

Se place à côté de *C. foveicollis* Murr., s'en distingue par la large coloration rouge des élytres. Nous donnons du reste, ci-après, un tableau des *Urophorus* établi après examen des types de toutes les espèces.

TABLEAU DES *UROPHORUS*

1. Téguments glabres	2
» Id. nettement pubescents	8
2. Elytres largement arrondis à l'angle sutural .	<i>nitidus</i> Murr.
» Id. à peine id. id. id.	3
3. Une large impression aux angles postérieurs du prothorax	<i>sanguinipennis</i> Grouv.
» Pas de id. id. id. id.	4
4. Bourrelet marginal de la base du prothorax très étroit, de niveau avec la surface du prothorax.	5
» Bourrelet marginal de la base du prothorax plus large, enfoncé par rapport à la surface du prothorax	7
5. Angles huméraux des élytres arrondis	<i>bicolor</i> Grouv.
» Id. id. id. marqués	6
6. Tête avec deux impressions. Elytres un peu plus larges que le prothorax	<i>heros</i> Grouv.
» Tête sans impressions. Elytres de la largeur du prothorax	<i>adumbratus</i> Murr.
7. Parallèle, subcylindrique. Elytres rouges	<i>rubripennis</i> Herr.
» Ovale. Couleur de poix	<i>discolor</i> Murr.
8. Convexe, en ovale court	<i>rubiginosus</i> Murr.
» Plus déprimé, en ovale plus allongé	9
9. Tégument finement réticulé	<i>Fcae</i> Grouv.
» Id. lisse	10
10. Forme plus parallèle, angles antérieurs du prothorax noirs	<i>humeralis</i> Fab.
» Forme ovale allongée. Angles antérieurs du prothorax rougeâtres	<i>foveicollis</i> Murr.

15. *Carpophilus Modiglianii*, n. sp. — *Oblongus, convexus, nitidus, glaber, piceus; basi antennarum, elytris extra latera apicemque, pygidio pedibusque ochraceo-testaceis; capite prothoraceque dense punctatis, hoc transverso antice angustato; elytris punctatis.* — Long. 2 mill. $\frac{3}{4}$.

Oblong, convexe, assez brillant, glabre, brun de poix; antennes sauf la massue, bouche, élytres, excepté une étroite bordure latérale et une plus large bordure apicale, pygidium et pattes d'un testacé jaunâtre. Tête densément et assez fortement ponctuée. Prothorax environ deux fois aussi large que long, subparallèle à la base, rétréci au sommet, couvert d'une ponctuation grosse et serrée; angles antérieurs arrondis, postérieurs obtus, émoussés. Ecusson en triangle curviligne. Elytres un peu plus longs que large ensemble, densément ponctués, mais plus finement que le prothorax, tronqués obliquement au sommet laissant à découvert les deux derniers segments de l'abdomen. Dessous brun de poix.

Sumatra (Doloc Tolong). E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gênes.

16. *Carpophilus pygidialis*, n. sp. — *Ovatus, convexus, nitidus, flavo-pubescentis, reticulatus, testaceo-ferrugineus; sutura lateribusque elytrorum stricte, apice latiore brunneo marginatis; capite prothoraceque punctatis; scutello pentagonali, haud punctato; elytris prothorace minus fortius punctatis; pygidio in longitudinem obtuse carinato.* Long. 2 mill. $\frac{1}{2}$.

Ovale, convexe, brillant, finement réticulé, garni d'une pubescence flave, peu dense, d'un testacé ferrugineux, étroitement rembruni le long de la suture et des côtés, plus largement au sommet. Tête éparsement mais assez fortement ponctuée, avec deux impressions ponctiformes entre les yeux. Prothorax transversal, arrondi sur les côtés, plus fortement rétréci au sommet qu'à la base, un peu plus densément ponctué que la tête. Ecusson transversal, pentagonal, non ponctué. Elytres à peine plus longs que larges ensemble, plus finement ponctués que le prothorax, obliquement tronqués au sommet. Rebords latéraux du pygidium relativement larges, disque relevé en une carène émoussée. Segment supplémentaire du mâle à peine visible du dessus.

Sumatra (Si-Rambé). E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gênes.

17. *Carpophilus debilis*, n. sp. — *Oblongus, subdepressus, opacus, reticulatus, tenuè pubescens, brunneus; antennis clavu excepta pe-*

dibusque rufo-testaceis; capite prothoraceque sat dense punctatis, hoc valde transverso, utrinque versus angulos posticos late impresso; scutello triangulari; elytris punctatis. — Long. 2 mill. $\frac{1}{4}$.

Oblong, subdéprimé, opaque, finement réticulé, couvert d'une pubescence flave, très éparse, brun; antennes, sauf la massue, et pattes roux testacé; 3.^{me} article des antennes plus long que les deux suivants réunis; premier article de la massue séparé des suivants. Tête assez convexe, densément ponctuée, marquée de deux impressions ponctiformes entre les bases des antennes. Prothorax plus de deux fois plus large que long, arrondi sur les côtés, à peine rétréci à la base, plus fortement au sommet, étroitement explané sur les côtés, largement impressionné vers les angles postérieurs, plus obsoletement, sur le disque, de chaque côté devant l'écusson. Ecusson triangulaire, largement bordé d'une marge lisse. Elytres moins longs que larges ensemble, plus éparsement et plus faiblement ponctués que le prothorax, obliquement tronqués au sommet. Segment abdominal supplémentaire du mâle caché par la marge apicale du pygidium.

Sumatra (Si-Rambé). E. Morigliani. Collection du Musée Civique de Gênes.

18. *Carpophilus familiaris*, n. sp. — *Oblongus, convexus, nitidus, flavo-pubescent, piceus; lateribus prothoracis, lata plaga basilari juxta suturam, antennis pedibusque testaceis; capite dense fortiterque punctato; prothorace transverso, antice angustato, sat dense punctato, lateribus arcuatis modice explanatis, margine antico subtruncato; scutello triangulari, punctato; elytris ovatis, apice truncatis; pygidio aperto, dense punctulato.*

MAS tibiis intermediis ad apicem intus incurvatis, extis spinosis. — Long. 2 mill. à 2 mill. $\frac{1}{2}$.

Oblong, convexe, brillant, couvert d'une pubescence flave peu serrée, assez longue, brun de poix avec la partie antérieure de la tête, les marges latérales du prothorax, une grande tache rectangulaire occupant sur chaque élytre l'angle scutellaire, les antennes et les pattes d'un testacé jaunâtre. Massue des antennes courte, dernier article de la largeur du précédent, terminé en bouton saillant. Tête densément et fortement ponctuée,

impressionnée de chaque côté vers la base de l'antenne. Prothorax environ deux fois plus large à la base que long, fortement rétréci en avant, arqué sur les côtés, subtronqué au sommet, moins densément et moins fortement ponctué que la tête; marges latérales médiocrement explanées; angles antérieurs obtus, postérieurs droits. Ecusson triangulaire arqué. Elytres à peine plus longs que larges ensemble, tronqués au sommet, ponctués comme le prothorax, arrondis aux épaules. Pygidium densément pointillé. Tibias intermédiaires du mâle fortement arqués en dedans au sommet, armés d'épines sur la partie convexe de la courbure.

M. Mooleyit (Tenasserim), récolté par M. r Fea. Collections du Musée Civique de Gênes, A. Fry et A. Grouvelle.

Quelques exemplaires ont la partie découverte de l'abdomen complètement testacée.

Cette espèce se range parmi les Nitidulides que l'extension plus ou moins prononcée des segments de l'abdomen conduit à classer parmi les Carphophiliens ou les Nitiduliens proprement dit. J'ai choisi le premier groupe, parce qu'il m'a semblé voir, sur les nombreux exemplaires examinés, le second segment de l'abdomen toujours en partie visible, mais je dois reconnaître que parfois ce caractère est bien peu accentué.

De plus le segment supplémentaire du mâle n'est pas apparent à l'état de repos, contrairement à ce qui existe chez les *Carphophilus*.

Primitivement j'avais rapporté cette espèce à l'*Eidocolastus dilutus* Murr., mais à la suite de l'examen d'un type communiqué par M. A. Fry de Londres, j'ai dû reconnaître mon erreur.

En résumé le *Carphophilus familiaris* mériterait peut-être l'honneur de devenir le type d'une nouvelle coupe générique, mais il semble préférable d'attendre qu'une connaissance plus complète des petits Nitidulides pseudo-Carphophiliens ait mieux permis de préciser leurs affinités relatives.

19. *Stauroglossicus variabilis*, n. sp. — *Oblongus, depressus, nitidus, glaber, rufo-testaceus, plus minusve infuscatus, dense punctatus, reticulatus; prothorace transverso, antice quam postice angu-*

stiore, angulis anticis subrotundatis, posticis obtusis, lateribus arcuatis; scutello triangulari, disco punctato; elytris ad apicem oblique truncatis; abdomine dense punctato. — Long. 1 mill. $\frac{1}{2}$ à 3 mill.

Oblong, déprimé, brillant, glabre, roux testacé, plus ou moins enfumé, de couleur très variable, finement réticulé, densément ponctué. Massue des antennes de trois articles, brune, le premier non contigu au suivant. Tête avec une impression arquée entre les naissances des antennes. Prothorax environ de moitié aussi long que large dans sa plus grande largeur, un peu plus rétréci au sommet qu'à la base; bords latéraux arqués, marge antérieure concave; angles antérieurs subarrondis, postérieurs obtus, légèrement épineux; marges latérales et basilaires rebordées. Ecusson triangulaire, avec quelques points serrés sur le disque. Elytres environ aussi longs que large ensemble, obliquement tronqués au sommet; épaulés légèrement dentées. Segments visibles de l'abdomen, surtout le pygidium densément ponctué.

Malacca; Archipel Malais. Collections A. Fry et A. Grouvelle. Musée Civique de Gènes.

Je réunis sous le nom *S. variabilis* une série d'insectes de forme et de couleur très variables. Le type de l'espèce est de couleur rousse, enfumé à la suture, au sommet des élytres et sur les côtés; sa taille est relativement développée et sa largeur est environ les $\frac{2}{5}$ de la longueur, mais les caractères semblent d'une variabilité extraordinaire, on rencontre des exemplaires, de petite taille étroits ou complètement noirs.

20. *Stauroglossicus dubitabilis*, n. sp. — *Oblongus, vix convexus, nitidus, flavo-pubescens, haud reticulatus, dense punctatus, niger; elytris rufo-maculatis, antennis clava excepta pedibusque rufis; prothorace transverso, antice posticeque angustato, lateribus arcuatis, margine antico subtruncato, basilari recto, marginato, lateralibus marginatis, disco depresso; scutello subpentagonali, disco punctato; elytris ad apicem oblique truncatis.* — Long. 2 mill. $\frac{1}{2}$.

Oblong, à peine convexe, brillant, couvert d'une pubescence flave, densément ponctué, non réticulé, noir; sur chaque élytre une longue tache d'un roux ferrugineux, mal limitée s'étendant

sur le disque entre les épaules et la région suturale; antennes, sauf la massue, et pattes rougeâtres. Prothorax environ de moitié aussi long que large dans la plus grande largeur, aussi rétréci à la base qu'au sommet, arqué sur les côtés, presque tronqué au sommet, rebordé sur les côtés et moins fortement à la base, déprimé sur le disque; tous les angles obtus. Ecusson subpentagonal, ponctué sur le disque. Elytres environ aussi longs que larges ensemble, obliquement tronqués au sommet. Pygidium plus densément et plus fortement ponctué que l'avant dernier segment de l'abdomen.

Birmanie (Mines de rubis). Collections A. Fry et A. Grouvelle.

Espèce voisine de *S. variabilis* Grouv., mais distincte par l'absence de réticulation sur le tégument.

21. *Stauroglossicus opaculus*, n. sp. — *Oblongus, depressus, subopacus, rufo-brunneus, dense granoso, pube fulva dense vestitus; prothorace transverso, lateribus haud stricte explanatis; scutello subpentagonali.* — Long, 2 mill.

Oblong, déprimé, presque opaque, brun rougeâtre, couvert d'une pubescence couchée, d'un jaune fauve, assez longue masquant presque le tégument. Antennes et pattes rougeâtres, massue des premières brune, formée de trois articles dont le premier est séparé du suivant. Tête transversale, couverte de fines granulations serrées, impressionnée de chaque côté à la naissance des antennes. Prothorax transversal, rétréci à la base et au sommet, sculpté comme la tête, assez largement explané de chaque côté. Ecusson subpentagonal. Elytres environ aussi longs que larges ensemble, légèrement acuminés au sommet, obliquement tronqués, sculptés comme le reste du tégument.

Java (Pen'galen'gan). Collection Grouvelle. Sumatra (Si-Rambé). E. Moligliani. Collection du Musée Civique de Gênes.

22. *Eidocolastus nigricans*, n. sp. — *Oblongus, subdepressus, nitidus, vix pubescens, nigro-piceus; antennis clava excepta rufofuscis; prothorace transverso, antice angustato, punctato; angulis posticis acutis; scutello subtriangulati, parcissime punctulato; elytris punctatis, in disco macula dilutiore.* — Long, 2 mill. $\frac{1}{2}$.

Oblong, subdéprimé, brillant à peine pubescent, noir de poix

avec une vague tache plus claire sur chaque élytre. Antennes, sauf la massue, d'un roux un peu enfumé; premier article de la massue séparé des suivants. Tête un peu convexe, ponctuée. Prothorax deux fois aussi large à la base que long, parallèle à la base, rétréci au sommet, assez étroitement rebordé sur les côtés, plus fortement ponctué que la tête; angles postérieurs aigus, base échancrée de chaque côté. Ecusson triangulaire, à peine ponctué. Elytres un peu moins longs que larges ensemble, couverts d'une ponctuation devenant obsolète vers le sommet, très finement réticulés.

Sumatra (Si-Rambé). E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gênes.

23. **Haptoncus prolatus**, n. sp. — *Oblongus, subparallelus, modice convexus, subnitidus, pubescens, fulvo-testaceus; prothorace transverso, antice subtruncato, dense punctato; elytris prothorace minus dense fortiterque punctatis, apice oblique truncatis.* — Long. 2 mill. $\frac{1}{2}$.

Oblong, subparallèle, un peu convexe, assez brillant, couvert d'une pubescence flave, couchée et peu serrée, testacé flave. Tête assez densément et fortement ponctuée, assez brusquement déprimée en avant de la naissance des antennes. Prothorax environ une fois et demie aussi large à la base que long, subparallèle à la base, un peu rétréci au sommet, assez densément et fortement ponctué, non explané sur les côtés, base subéchancrée de chaque côté du milieu. Ecusson triangulaire, ponctué. Elytres de la largeur du prothorax, subparallèles, un peu plus longs que larges ensemble, obliquement tronqués au sommet, moins fortement et plus densément ponctués que le prothorax. Marge apicale du dernier segment de l'abdomen portant au milieu un petit faisceau saillant formé de poils présentant l'aspect d'une épine.

Sumatra (Deli). Collection A. Grouvelle.

24. **Haptoncus depressus**, n. sp. — *Elongatus, parallelus, subdepressus, vix nitidus, dilute testaceus, dense punctatus; prothorace transverso, antice angustato, lateribus basin versus parallelis; scutello triangulari; elytris sat elongatis, apice oblique truncatis.* — Long. 2 mill. à 2 mill. $\frac{1}{2}$.

Allongé, parallèle, presque déprimé, à peine brillant, d'un testacé clair, couvert d'une pubescence flave couchée peu serrée, densément ponctué. Tête impressionnée très faiblement de chaque côté à la naissance des antennes, d'un roux testacé. Prothorax environ une fois et demie aussi large à la base que long, subparallèle à la base, rétréci au sommet; base subsinuée de chaque côté de l'écusson. Ecusson triangulaire. Elytres de la largeur du prothorax, plus longs ensemble que larges, obliquement tronqués au sommet. Pygidium déprimé, densément pointillé.

Marge inférieure du dernier segment abdominal du mâle portant trois longues soies; segment supplémentaire caché à l'état normal, terminé par deux longues épines souvent en partie visibles, lorsqu'il est caché.

Sumatra (Deli et Balighe). Collections du Musée Civique de Gênes et A. Grouvelle.

25. **Eपुरaea Modiglianii**, n. sp. — *Ovata, convexa, nitida, dense punctata, flavo-pubescent, brunneo-testacea; clava antennarum infusca; prothorace transverso, antice angustato, margine antico profunde emarginato, lateribus arcuatis; disco utrinque, margine explanato et bianguloso incluso; scutello subtriangulari; elytris apice truncatis.*

♂. *Tibiis intermediis intus ad apicem fortiter incurvatis.* — Long. 4 mill.

Ovale, convexe, brillant, densément ponctué, garni d'une pubescence flave, couchée, écartée, testacé brunâtre, un peu plus foncé sur les élytres. Massue des antennes noirâtre, dernier article notablement plus étroit que le précédent. Une impression pontiforme de chaque côté de la tête, vers la base des antennes. Prothorax environ deux fois et demie plus large à la base que long, fortement rétréci au sommet, arqué sur les côtés; bord antérieur largement et profondément échancré, marges latérales largement explanées, limitées en dedans par une ligne brisée formant deux angles droits, partie explanée relevée en dedans, le long de la base et formant avec la convexité du disque un petit sillon longitudinal se recourbant en dedans. le long de la base; celle-ci légèrement échancrée de chaque

côté de l'écusson. Ecusson triangulaire, plus large que long. Elytres de la largeur du prothorax à la base, atténués vers le sommet, tronqués, environ aussi longs que larges ensemble, médiocrement explanés sur les côtés. Tibias intermédiaires du mâle fortement arqués en dedans à l'extrémité.

Sumatra (Si-Rambé). E. Moligliani. Collection du Musée Civique de Gênes.

Voisine de *E. nitida* Reitt.

26. *Eपुरaea pumila*, n. sp. — *Oblonga, convexa, subopaca, flavo-pubescentis, testacea; clava antennarum obscura; prothorace transverso, antice angustato, margine antico emarginato, lateribus arcuatis, reflexis, concavis; elytris ad apicem separatim rotundatis; processu abdominalis obtuse angulato.*

Mas. *Tibiis intermediis simplicibus.* — Long. 2 mill. $\frac{1}{3}$.

Oblong, convexe, peu brillant, couvert d'une pubescence flave assez serrée, jaune testacé. Massue des antennes rembrunie, dernier article de la massue plus étroit que le précédent, articles 3 et 5 de l'antenne allongés, 4 presque carré. Prothorax environ deux fois plus large à la base que long, rétréci au sommet, à peine à la base, arqué sur les côtés, largement échancré au sommet, pas très largement rebordé, relevé sur les côtés; angles antérieurs arrondis, postérieurs droits. Ecusson triangulaire. Elytres ovales, environ une fois et un tiers aussi longs que larges ensemble, arrondis séparément au sommet. Dessous testacé, saillie du premier segment de l'abdomen assez large, obtusement anguleuse. Tibias intermédiaires des mâles droits.

Inde. Collections A. Fry et A. Grouvelle.

Voisine de *E. melina* Er., mais plus petite, d'une coloration jaune testacé différente et autrement découpé au sommet des élytres.

27. *Eपुरaea subreticulata*, n. sp. — *Ovata, convexa, subnitida, tenue flavo-pubescentis, sat parce punctata, subreticulata, fusco-testacea; disco prothoracis, lateribus apiceque elytrorum nigricantibus; clava antennarum infuscata; prothorace transverso, antice angustato, lateribus arcuatis, sat late explanatis; elytris prothorace duplo longioribus, lateribus basin versus explanatis, apice separatim rotundatis.* — Long. 3 mill.

MAS *tibiis intermediis simplicibus*.

Ovale, convexe, peu brillant, enfumé sur le disque du prothorax et sur les côtés et le sommet des élytres, peu densément ponctué, finement chagriné, couvert d'une pubescence flave, courte et assez écartée. Massue des antennes noirâtre; dernier article plus étroit que le précédent. Prothorax un peu plus de deux fois plus large à la base que long, fortement rétréci au sommet; bord antérieur à peine échancré, côtés arrondis assez largement explanés surtout vers la base; celle-ci sinuée de chaque côté vers les extrémités; angles antérieurs arrondis, postérieurs aigus. Ecusson triangulaire. Elytres ovales, environ aussi longs que larges ensemble, arrondis séparément au sommet; bord réfléchi, s'atténuant progressivement jusqu'au sommet.

Tibias intermédiaires du mâle simples.

Sumatra (Balighe, Si-Rambé). E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gênes.

28. *Eपुरaea Simsoni*, n. sp. — *Oblonga, modice convexa, subnitida, parce flavo-pubescentis, rufo-ferruginea, saepius infuscata; clava antennarum nigra; prothorace transverso, antice angustato, lateribus rotundatis, stricte explanatis, margine antico late emarginato; elytris oblongis, stricte marginatis, ad apicem oblique subtruncatis.*

MAS *tibiis intermediis simplicibus*. — Long. 2 mill. $\frac{1}{3}$.

Allongé, oblong, médiocrement convexe, assez brillant, couvert d'une pubescence flave, peu serrée, roux ferrugineux, mais parfois brun rougeâtre de chaque côté du disque du prothorax et sur les élytres. Massue des antennes noirâtre; dernier article plus étroit que le précédent, articles 4 à 5 de l'antenne allongés. Prothorax plus de deux fois plus large que long, rétréci au sommet, arrondi sur les côtés, largement échancré au sommet; bords latéraux très étroitement explanés, un peu plus largement à la base. Ecusson roux; triangulaire. Elytres environ une fois et un tiers aussi longs que larges ensemble; étroitement rebordés sur les côtés, obliquement subtronqués au sommet. Dessous d'un brun rougeâtre clair. Saillie du premier segment de l'abdomen anguleuse.

Tibias intermédiaires du mâle simples.

Tasmanie. Collections A. Fry et A. Grouvelle.

29. *Eपुरaea tasmanica*, n. sp. — *Oblonga, convexa, subnitida, parce pubescens, tenue flavo-pubescens, testacea; capite prothoraceque leviter infuscatis; clava antennarum testacea; prothorace transverso, antice angustato, lateribus rotundatis, margine antico submarginato; elytris ad apicem truncatis, lateribus tenuiter marginatis; processu abdominis lato, obtuse angulato.*

MAS tibiis intermediis latis, laevibus incurvatis. — Long. 1 $\frac{2}{3}$.

Oblong, convexe, assez brillant, éparsément ponctué, couvert d'une pubescence flave, courte et peu serrée, testacé, légèrement rembruni sur la tête et le prothorax. Articles 3 à 5 des antennes allongés; massue testacée, dernier article aussi large que le précédent. Prothorax environ deux fois plus large à la base que long, rétréci au sommet, bords latéraux finement rebordés. Ecusson triangulaire. Elytres environ une fois et un quart aussi longs que larges ensemble, tronqués au sommet; bords latéraux étroitement rebordés, mais un peu plus largement que ceux du prothorax. Dessous testacé; saillie de l'abdomen large anguleuse. Tibias intermédiaires du mâle larges, droits.

Tasmanie. Collections A. Fry et A. Grouvelle.

Remarquable par sa forme régulièrement ovale.

30. *Micrurula fallax*, n. sp. — *Oblonga, sat convexa, subnitida, flavo-pubescens, fulvo-testacea, prothorace transverso, dense punctato, antice angustato; scutello triangulari, elytris subrugose punctatis, apice truncatis.* — Long. 1 mill. $\frac{3}{4}$.

Oblong, assez convexe, un peu brillant, couvert d'une pubescence flave, couchée, assez épaisse, mais ne masquant pas la couleur du tégument, d'un testacé un peu fauve. Dernier article de la massue des antennes moins large et plus court que le précédent. Tête densément et assez fortement ponctué. Prothorax un peu plus de deux fois plus large à la base que long, à peine rétréci à la base, assez fortement au sommet, à peine rebordé, assez fortement et densément ponctué; marge antérieure presque droite; angles antérieurs arrondis, postérieurs obtus. Ecusson triangulaire. Elytres un peu plus longs que larges ensemble, un peu plus larges que le prothorax, couverts d'une ponctuation un peu écartée, subrapeuse, subtronqués au sommet. Pygidium densément pointillé.

Sumatra (Doloc Tolong). E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gênes.

31. **Haptoncura opaca**, n. sp. — *Oblongo-elongata, modice convexa, opaca, flavo-pubescent, ferrugineo-testacea; prothorace transverso, antice late leviterque emarginato, dense punctato, lateribus arcuatis, subtiliter reflexo-marginatis; elytris ad apicem separatim rotundatis.* — Long. 2 mill.

Oblong, assez allongé, médiocrement convexe, mat, couvert d'une pubescence flave, couchée ne masquant pas le tégument, d'un testacé un peu rougeâtre. Dernier article de la massue des antennes plus étroit et moins long que le précédent. Prothorax environ deux fois plus large que long, un peu plus rétréci au sommet qu'à la base, arqué sur les côtés, à peine rebordé, densément ponctué; angles antérieurs arrondis, postérieurs obtus. Ecusson triangulaire. Elytres environ de la largeur du prothorax, une fois et un quart aussi longs que larges ensemble, arrondis séparément au sommet, un peu moins mats que le prothorax, plus éparsement et plus superficiellement ponctués. Pygidium densément ponctué, plus mat que les élytres.

Sumatra (Benculen). E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gênes.

32. **Haptoncura nitescens**, n. sp. — *Oblonga, modice convexa, sat nitida, flavo-pubescent, sat fortiter punctata; prothorace antice quam postice angustato, margine antico emarginato, lateribus rotundatis sat late explanatis; scutello triangulari; elytris paulo elongatis quam simul latis, apice truncatis.* — Long. 1 mill. $\frac{1}{4}$.

Oblong, un peu convexe, assez brillant, garni d'une pubescence flave, peu serrée, assez fortement et densément ponctué. Massue des antennes testacée, dernier article un peu plus étroit que le précédent. Front convexe. Prothorax plus de deux fois plus large à la base que long, plus rétréci au sommet qu'à la base, arrondi sur les côtés, fortement et largement échancré au sommet, assez largement explané sur les côtés, angles antérieurs arrondis; base sinuée de chaque côté vers les angles. Ecusson triangulaire, ponctué. Elytres de la largeur du prothorax à la base, à peine élargies vers le milieu, subatténués au sommet, environ aussi

longs que larges ensemble, un peu moins fortement ponctués que le prothorax; marges latérales moins explanées à la base que le prothorax, sommet tronqué, angles internes et externes arrondis.

Sumatra: Deli, Ajer-Manteior, O. Beccari; Balighe, Si-Rambé, E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gènes.

33. *Haptoncura dubia*, n. sp. — *Ovata, modice convexa, subnitida, flavo-pubescentis; dense punctata, testacea, elytris saepe extus infuscatis; prothorace valde transverso, antice angustato, margine antico emarginato; scutello triangulari; elytris apice truncatis; lateribus prothoracis elytrorumque sat late explanatis.* — Long. 2 mill. $\frac{1}{2}$.

Ovale, assez large, un peu convexe, légèrement brillant, garni d'une pubescence claire, couchée, peu serrée, densément et subrugueusement ponctué. Massue des antennes testacée. Prothorax plus de deux fois plus large à la base que long, très rétréci au sommet, régulièrement arqué de la base au sommet; marge antérieure largement échancrée, côtés assez largement explanés, base assez largement sinuée de chaque côté vers les extrémités; angles antérieurs arrondis. Ecusson triangulaire. Elytres de la largeur du prothorax à la base, environ aussi longs que larges, notablement atténués vers le sommet, assez largement explanés sur les côtés, tronqués au sommet.

L'un des deux exemplaires examinés est d'une nuance générale testacée très légèrement enfumée; l'autre est d'une teinte plus foncée sur les élytres, sauf autour de l'écusson et sur les replis latéraux et présente une tache orbiculaire claire vers le tiers apical.

Sumatra (Si-Rambé). E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gènes.

34. *Prometopia dorsalis*, n. sp. — *Ovata, modice convexa, subnitida, flavo-pubescentis, dupliciter punctata, nigra, lateribus prothoracis elytrorumque, magna macula suturali, bilobata, in elytris rufis; prothorace transverso, margine antico late profundeque emarginato, punctato, punctis in lateribus fortioribus, punctis valde minoribus intermixtis; lateribus prothoracis elytrorumque late reflexo-marginatis.* — Long. 3 mill. $\frac{1}{2}$.

Ovale, médiocrement convexe, assez brillant, couvert d'une pubescence flave, double, noir. Marges latérales du prothorax et des élytres largement bordées de rougeâtre; sur le disque des élytres une tache transversale de même couleur, formée de deux taches orbiculaires, soudées sur la suture. Ponctuation générale double, formée de gros points enfoncés et espacés, entremêlés de points beaucoup plus petits; gros points plus forts et plus serrés sur les côtés du prothorax et des élytres. Marges latérales du prothorax et des élytres largement explanées relevées; marges des élytres séparées du disque, à la base, par une ligne de gros points enfoncés. Elytres un peu moins longs que larges ensemble.

Sumatra (Deli). Collection A. Grouvelle.

33. *Prometopia suturalis*, n. sp. — *Ovata, modice convexa, subnitida, flavo-pubescent, dupliciter punctata, nigro-brunnea, lateribus prothoracis elytrorumque late, margine antico prothoracis et sutura elytrorum minus late, rufo-marginatis; capite prothoraceque grosse parceque punctatis, intervallis punctorum punctulatis; margine antico prothoracis late profundeque emarginato; lateribus prothoracis elytrorumque late reflexo-explanatis; antennis pedibusque rufo-testaceis.* — Long. 3 mill. à 4 mill. $\frac{1}{2}$.

Ovale, médiocrement convexe, un peu brillant, couvert d'une pubescence double flave, brun noir, largement bordé de rougeâtre sur les côtés du prothorax et des élytres et plus étroitement à la marge antérieure du prothorax et à la suture des élytres. Pattes et antennes rougeâtres. Ponctuation de la tête et du prothorax double, formée de gros points enfoncés, espacés et entremêlés de points beaucoup plus petits. Prothorax plus de deux fois plus large à la base que long, profondément et largement échancré au bord antérieur, arrondi sur les côtés, moins fortement ponctué sur le disque; marges latérales largement explanées, relevées. Elytres à ponctuation double, surtout sur les côtés, environ aussi longs que larges ensemble; marges latérales brusquement explanées, relevées, séparées du disque à la base, par une ligne de plus gros points enfoncés; bordure rougeâtre des élytres dilatée vers l'épaule.

Perak. Collection A. Grouvelle.

36. **Prometopia obscura**, n. sp. — *Ovata, sat convexa, nitida, nigra, flavo-griseo pubescens, dupliciter punctata; capite grosse parceque punctato, intervallis punctorum punctulatis; prothorace transverso, antice profunde emarginato, utrinque grosse parceque punctato, lateribus late subexplanatis, stricte testaceo marginatis; elytris dense punctatis, lateribus strictissime testaceo marginatis.* — Long. 4 mill. $\frac{1}{2}$.

Ovale, assez convexe, noir, brillant, couvert d'une pubescence double, jaune grisâtre, un peu lanugineuse. Ponctuation de la tête double, formée de gros points épars, entremêlés de petits points. Prothorax environ deux fois plus large à la base que long, profondément échancré à la marge antérieure, rétréci au sommet, fortement arqué sur les côtés, finement ponctué sur toute la surface et en plus fortement et éparsément ponctué sur les côtés; marges latérales assez largement explanées, subconcaves, bordées d'un étroit liseré testacé, qui se retourne de chaque côté le long de la base. Elytres ovales, environ aussi longs que larges à la base, densément ponctués; marges latérales moins largement explanées que le prothorax, séparées du disque à la base par une ligne de gros points enfoncés, bordées d'un liseré testacé plus étroit que celui du prothorax. Pattes testacées.

Sumatra (Si-Rambé). E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gênes.

TABEAU DES *PROMETOPIA* DES INDES ORIENTALES

1. Chaque élytre marqué de deux taches claires; forme allongée (1)	2
• Elytres concolores ou non marqués de deux taches claires; forme plus large	3

(1) Nous connaissons seulement ces deux espèces par la description. L'examen de nombreux exemplaires de diverses provenances, Iles Andaman, Birmanie, Archipel Malais, Iles Viti, nous porte à penser qu'il faudra les réunir.

2. Tache de la base peu développée transversalement *quadrinaculata* Mots.
 » Id. id. très développée transversalement. *Catilina* Oliff.
 3. Une tache suturale commune *dorsalis* Group.
 » Pas de tache suturale commune 4
 4. Bordure latérale claire du prothorax et des élytres très étroite; couleur générale noirâtre. *obscura* Group.
 » Bordure latérale claire du prothorax et des élytres large 5
 5. Suture concolore *rhombus* Oliff.
 Id. rougeâtre *suturalis* Group.

37. **Lasiodactylus Modiglianii**, n. sp. — *Ovatus, modice convexus, subnitidus, fulvo-pubescens, infuscato-testaceus, dense punctatus; clava antennarum nigra; prothorace valde transverso; elytris ad apicem attenuatis, haud carinatis.* — Long. 6 mill.

Ovale, assez large, médiocrement convexe, peu brillant, testacé un peu rembruni, couvert d'une pubescence fauve formée de petits poils couchés, peu serrés, densément ponctué. Massue des antennes courte, noire, subtronquée, terminée par un bouton saillant au milieu de la partie subtronquée. Tête fortement impressionnée de chaque côté vers la naissance des antennes, longitudinalement carénée sur le front. Prothorax environ trois fois aussi large à la base que long, fortement rétréci en avant, largement échancré à la marge antérieure, finement rebordé, plus densément mais moins fortement ponctué que la tête. Elytres de la largeur du prothorax à la base, sensiblement plus longs que larges ensemble, atténués au sommet, plus fortement ponctués que le prothorax, arrondis séparément au sommet, sans traces de côtes; marges latérales explanées mais modérément.

Sumatra (Si-Rambé). E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gênes.

38. **Aethina puncticollis**, n. sp. — *Breviter oblonga, convexa, subnitida, brunnea, flavescens; prothorace flavo-pubescente pilis ad latera basinque densioribus et longioribus; elytris cinereo pubescentibus, striâ suturali nulla.* — Long. 3 mill. $\frac{1}{2}$.

Courtement ovale, convexe, un peu brillant, brun pas très foncé, couvert d'une pubescence flave dorée sur le prothorax

plus dense et plus longue sur les côtés et dans la région basilaire, formant devant l'écusson deux macules de poils longs et serrés dirigés vers l'arrière. Prothorax très transversal, fortement rétréci en avant, parallèle à la base, densément ponctué. Ecusson fortement pubescent. Elytres un peu moins longs que larges ensemble, arrondis séparément au sommet, sans strie suturale; pubescence double formée de poils couchés peu serrés et de poils plus longs disposés en lignes. Pieds comprimés.

Tenasserim. Collection A. Fry.

39. *Aethina basalis*, n. sp. — *Oblonga, convexa, nitida, fulvo-pubescentis; capite prothoraceque fulvo-testaceis; elytris testaceis, basi apiceque infuscatis; prothorace transverso, antice angustato, margine antico truncato, scutello rufis; elytris ad apicem separatim rotundatis.* — Long. 3 mill. à 3 mill. $\frac{1}{2}$.

Oblong, assez large, convexe, brillant, couvert d'une pubescence fauve claire, peu serrée. Tête et prothorax d'un jaune testacé peu accentué; élytres testacés, chacun avec une bande basilaire noire s'avancant au lobe arrondi sur l'épaule et une tache apicale de même couleur s'avancant anguleusement sur le disque; massue des antennes noire. Tête assez fortement ponctuée, profondément impressionnée, excavée entre les bases des antennes, finement réticulée. Prothorax presque trois fois plus large à la base que long, rétréci au sommet, bords latéraux peu arqués, marge antérieure tronquée; ponctuation assez forte et assez serrée; tégument finement réticulé. Ecusson rougeâtre. Elytres sensiblement de la largeur du prothorax à la base, oblongs, un peu plus longs que larges ensemble, arrondis séparément au sommet, assez fortement et densément ponctués, présentant quelques vestiges de côtes. Pygidium découvert présentant contre la base une ligne de gros points enfoncés.

Sumatra. Collection Grouvelle.

Voisin de *Aethina humeralis* Grouv., mais distinct par son prothorax à bords latéraux très faiblement arqués, la disposition différente des taches noires des élytres, et qui n'envahit pas la marge latérale et par les angles apicaux internes des élytres qui sont à peine marqués.

40. **Circopes ruficollis**, n. sp. — *Hemisphaericus*, longe flavo-griseo pubescens, elytris margine apicali excepto et abdomine ultimis segmentis exceptis, nigris. — Long. 7 mill. $\frac{1}{2}$.

Subhémisphérique, assez brillant, couvert d'une pubescence d'un gris flave, assez épaisse, formant sur le prothorax comme des petits faisceaux de poils convergents et déterminant sur les élytres des lignes assez régulières de poils plus longs entremêlées de poils plus courts. Couleur rouge; élytres sauf l'extrême marge apicale et abdomen sauf les derniers segments, noirs.

Celèbes (Banguey); collection Grouvelle.

Sumatra (Pangherang-Pisang). E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gênes.

41. **Amphicrossus oblongus**, n. sp. — *Oblongo-ovatus*, nigro-brunneus, dense punctatus, fulvo-pubescens; antennis pedibusque fusco-ferrugineis; lateribus prothoracis elytrorumque sat longe ciliatis; prothorace in longitudinem vage subsulcato.

MAS. Fasciculo suturali nullo; segmento 5.^o abdominis apice emarginato, in medio lobo minuto producto. — Long. 3 mill. $\frac{1}{2}$ à 5 mill. $\frac{1}{2}$.

Oblong, un peu plus long que large, noir brunâtre, densément ponctué, couvert d'une pubescence fauve, fine et peu dense, entremêlée de poils plus longs. Bords latéraux du prothorax et des élytres bordés d'une frange de poils assez longs. Tégument finement réticulé; ponctuation de la tête à peine plus forte que celle des élytres. Prothorax vaguement subsillonné dans la longueur. Dernier segment abdominal du mâle échancré au sommet et armé au milieu de l'échancrure d'un petit denticule.

Sumatra (Padang). E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gênes. (Palembang). Collection A. Grouvelle.

Espèce voisine de l'*A. discolor* Er., distincte par l'absence chez le mâle de fascicule sur la suture des élytres.

42. **Amphicrossus Bouchardi**, n. sp. — *Oblongo-ovatus*, brunneus, densissime punctulatus, opacus, fulvo-griseo pubescens; antennis pedibusque fusco-ferrugineis; lateribus prothoracis elytrorumque ciliatis.

MAS. *Fasciculo suturali nullo; segmento 5.º apice emarginato, in medio lobo minuto producto.* — Long. 3 mill. $\frac{1}{2}$ à 5 mill. $\frac{1}{2}$.

Oblong, un peu plus long que large, brun, couvert d'une punctuation très fine et très serrée qui lui donne un aspect mât, très finement pubescent. Bord latéraux du prothorax et des élytres bordés d'une frange de poils courts. Prothorax très transversal, angles postérieurs subarrondis; base très légèrement concave par rapport aux élytres.

Dernier segment abdominal du mâle échancré au sommet et armé au milieu de l'échancrure d'un petit denticule saillant.

Sumatra (Palembang), Perak; collection A. Grouvelle.

Distinct de tous les *Amphicrossus* des Indes Orientales par son aspect entièrement mât.

43. *Cyllodes frontalis*, n. sp. — *Subhemisphaericus, convexus nitidus, niger; fronte, quatuor maculis, duabus primis utrinque discoprothoracis juxta basin, alteris in elytris, orbicularibus et discoidalibus, pygidio, antennis clava excepta, pedibusque rufis; prothorace valde transverso; elytris parce punctulatis.* — Long. 4 mill. $\frac{1}{2}$ à 5 mill.

Subhémisphérique, convexe, noir, brillant. Antennes sauf la massue d'un roux testacé. Tête assez densément pointillée; bouche et front rougeâtre. Prothorax environ quatre fois plus large à la base que long, marqué de chaque côté d'une grande tache rougeâtre, touchant presque la base. Elytres un peu plus larges ensemble que longs, finement et éparsément pointillés, chacun avec une tache rouge discoidale et orbiculaire. Pygidium roux.

Sumatra (Pangherang - Pisang). E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gènes.

Cette espèce est décrite sur deux exemplaires d'une taille plus grande et d'une forme plus large que chez *Cyllodes dorsalis* Reitt. De plus chez notre nouvelle espèce la couleur rouge lorsqu'elle envahit la base du prothorax ne gagne pas le long de la marge latérale, qui par suite reste noire, sauf l'extrême sommet de l'angle antérieur.

44. *Cyllodes variegatus*, n. sp. — *Oblongus, convexus, nitidus, glaber, piceus, testaceo-variegatus; antennis pedibus et corpore subtus testaceis.* — Long. 3 mill. $\frac{1}{2}$.

Oblong, convexe, brillant, glabre, brun de poix, varié de testacé. Tête testacée rembrunie sur le disque. Prothorax testacé, de chaque côté un point foncé, marge antérieure bordée dans le milieu d'une tache foncée formée de deux gros points réunis; base bordée dans le milieu d'une tache foncée présentant en avant quatre lobes saillants et dans le milieu une profonde échancrure subrectangulaire. Elytres foncés, plus claires au sommet, marqués chacun d'une tache ondulée, bordant l'écusson, une fraction de la base, redescendant parallèlement à la suture, se retournant perpendiculairement, puis parallèlement à la suture et se terminant par une partie arquée en dedans et plus ou moins ondulée. Dessous testacé.

Indes orientales (sans localité précise). Collection A. Fry.

45. *Cyllodes orientalis*, n. sp. — *Subhemisphaericus, nitidus, glaber, rufo-testaceus; clava antennarum infuscata; capite parce punctato, prothorace valde transverso, vix perspicue punctato, basi medio producto; angulis posticis subrectis, scutello subpentagonali parce punctato; elytris ad apicem separatim rotundatis, leviter lineato-punctatis, intervallis parcissime punctulatis.* — Long. 3 mill.

Subhémisphérique, brillant, glabre, roux testacé. Massue des antennes enfumée, formée d'articles transversaux plus dilatés du côté interne. Tête éparsément ponctuée, impressionnée entre les yeux. Prothorax très transversal, fortement rétréci en avant, à peine visiblement pointillé; marge antérieure profondément et largement échancrée, angles postérieurs presque droits, à peine émoussés; base saillante dans le milieu sur l'écusson. Ecusson subpentagonal, pointillé. Elytres arrondis séparément au sommet, finement ponctués en lignes, intervalles, très éparsément pointillés, pas de strie suturale.

Borneo. Collection A. Fry.

Je rapporte à la même espèce un exemplaire appartenant également à la collection de M. A. Fry et provenant de Perak.

46. **Cryptarcha octo-punctata**, n. sp. — *Oblongo-ovata, convexa, nitida, glabra, nigra; capite punctato, prothorace parçissime punctato; elytris ad apicem subrotundatis, singulo ochraceo quadri-maculato, 1.^a juxta basin, prope scutellum, 2.^a et 3.^a lateralibus, 4.^a discoidali, stria suturali ad apicem impressa.* — Long. 3 mill. $\frac{3}{4}$.

Oblong, convexe, brillant, glabre, noir. Tête peu densément et assez fortement ponctuée. Prothorax transversal, rétréci en avant, très éparsément et beaucoup plus finement ponctué que la tête. Ecusson transversal, lisse. Elytres un peu plus longs que larges ensemble, subarrondis au sommet, chacun avec une fine strie suturale plus marquée au sommet, atténuée vers le milieu de la longueur, chacun avec quatre taches suborbiculaires, jaunes: la 1.^{ère} contre la base, auprès de l'écusson; la 2.^{me} vers le quart de la longueur, contre le bord latéral; les 3.^{me} et 4.^{me} sur une ligne transversale, vers le tiers postérieur, l'une contre le bord latéral, l'autre discoidale. Pattes brunes, tarsi plus clairs.

Birmanie. Mines de rubis. Collection A. Fry.

47. **Cryptarcha basalis**, n. sp. — *Oblonga, convexa, nitida, glabra, picea; lateribus apiceque prothoracis stricte dilutioribus, basi elytrorum late et lateribus angustiore testaceis; capite punctato; elytris vage lineato-punctatis, intervallis punctatis.* — Long. 2 mill. $\frac{3}{4}$.

Oblong, convexe, brillant, glabre, brun de poix, plus clair sur les côtés du prothorax, largement testacé à la base des élytres, plus étroitement sur les côtés, marqué en plus d'une tache noire contre la base, près de l'épaule et d'une fascie transversale, testacée, vers le tiers postérieur, partant de la bande latérale et n'atteignant pas la suture. Antennes testacées rembrunies à la massue. Tête assez densément et finement ponctuée. Prothorax presque lisse. Elytres arrondis ensemble au sommet, présentant quelques lignes de petits poils dressés, légèrement ponctués en lignes, intervalles larges, finement ponctués; strie suturale bien marquée dans la moitié apicale. Pygidium caché.

Victoria (Nouvelle Hollande). Collection A. Fry.

Voisin de *C. nitidissima* Reitt.; distincte par la large bande testacée de la base des élytres et par les lignes très espacées de petits poils courts dressés. Parfois cette bande présente une seconde tache noire entre la tache humérale et l'écusson.

48. **Cryptarcha Modiglianii**, n. sp. — *Oblonga, convexa, nitida, glabra, nigra; capite punctato, plus minusve rufo-sanguinea; prothorace transverso, parce punctato, in disco et utrinque sanguineo-maculato, maculis externis parvis; elytris parce punctatis, haud striatis, singulo in disco late sanguineo-maculato; pygidio abdomineque rufis.* — Long. 2 mill. $\frac{3}{4}$.

Oblong, convexe, brillant, glabre, noir; tête plus ou moins rougeâtre; prothorax marqué de trois taches rouges arrondies, la tache discoidale très développée, les deux externes petites; élytres marqués, chacun d'une grande tache rouge atteignant la base, touchant presque la suture et s'étendant jusqu'aux deux tiers de la longueur. Tête éparsement ponctuée. Prothorax très transversal, très rétréci en avant, éparsement ponctué, base saillante sur l'écusson. Ecusson à peine visible, dans la position normale. Elytres atténués ensemble vers le sommet, à peine plus longs que larges à la base, arrondis ensemble au sommet, éparsement ponctués non striés. Pygidium, abdomen et pattes rougeâtres.

Sumatra (Si-Rambé). E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gênes.

49. **Cryptarcha coccinelloides**, n. sp. — *Oblonga, convexa, nitida, glabra, nigra; basi capitis, angulis anticis prothoracis et duabus maculis in singulo elythro rufis; prima macula discoidali, secunda apicali.* — Long. 2 mill. $\frac{3}{4}$.

Oblong, convexe, brillant, glabre, noir. Tête, sauf le sommet, deux grandes taches subcarrées aux angles antérieurs du prothorax, deux taches sur chaque élytre, la première orbiculaire sur le disque, la deuxième large apicale, pygidium, antennes et dessous rougeâtres. Tête et prothorax assez densément et assez fortement ponctués. Milieu de la base du prothorax, saillant sur l'écusson; celui-ci lisse. Elytres subtronqués au sommet, plus éparsement et moins fortement

ponctués que le prothorax, avec une très courte strie suturale au sommet.

Perak. Collection A. Fry.

Comme chez presque toutes les espèces variées de roux et de noir, le rapport entre les surfaces des deux couleurs peut varier d'un extrême à l'autre.

50. *Cryptarcha elegans*, n. sp. — *Ovata, convexa, nitida, glabra, nigra; capite, prothorace macula bi-lobata juxta scutellum excepta et macula apicali, bi-lobata, rufo-testaceis.* — Long. 2 mill. $\frac{1}{2}$.

Ovale, convexe, brillant, glabre, noir. Tête, prothorax sauf une tache bilobée devant l'écusson, extrémités des élytres sauf une bande noire avançant sur la suture, pygidium dessous et antennes d'un roux testacé. Tête et prothorax fortement et pas très densément ponctués. Base du prothorax saillante au milieu sur l'écusson. Ponctuation des élytres confuse, peu serrée, lisse sur le disque et au sommet, plus forte sur les côtés. Sommet subtronqué.

Perak. Collection A. Fry.

51. *Cryptarcha rufomaculata*, n. sp. — *Ovata, convexa, nitida, glabra, nigra; capite, prothorace margine basilari excepto, macula discoidali in singulo elytro, pygidioque rufis; elytris subtruncatis, sulco suturali ad apicem impresso.* — Long. 2 mill.

Ovale, convexe, brillant, glabre, noir. Tête, prothorax sauf une bordure marginale, basilaire, élargie dans le milieu en un renflement arqué, une tache discoidale, transversale, triangulaire sur chaque élytre, pygidium, dessous et antennes rougeâtres. Prothorax lisse, éparsément et finement ponctué sur les côtés; base saillante dans le milieu sur l'écusson; celui-ci lisse. Elytres ponctués sur les côtés, subtronqués au sommet; strie suturale marquée à l'extrémité.

Tenasserim. Collection A. Fry.

Espèce devant varier du roux au noir.

52. *Europs birmanica*, n. sp. — *Elongata, parallela, convexa, nitida, glabra, nigro-picea, antennis clava excepta, pedibusque, elytris rufo-sordidis; capite prothoraceque sat parce profundeque punctatis, hoc in longitudinem bi-impresso, impressionibus basin versus con-*

junctis, magis impressis; elytris reticulatis, punctato-striatis. — Long. 2 mill. $\frac{1}{2}$.

Allongé, parallèle, convexe, brillant, glabre, brun de poix foncé, antennes, sauf la massue, pattes et élytres d'un roux testacé, tégument enfumé. Antennes assez épaisses. Tête transversale, fortement, mais peu densément ponctuée, impressionnée de chaque côté à la naissance des antennes, sinuée au bord antérieur; yeux placés notablement en avant des angles postérieurs, ceux-ci droits, arrondis. Prothorax carré, ponctué comme la tête, marqué sur le disque de deux impressions longitudinales, obsolettes en avant, mieux marquées et presque réunies à la base, laissant entre elles un espace longitudinal, lisse. Ecusson lisse, subcarré. Elytres environ deux fois aussi longs que larges ensemble, nettement réticulés, ponctués-striés. Pygidium éparsément ponctué.

Birmanie (Mines de rubis). Collection A. Fry.

Eporus, n. gen. **Monotomidarum**.

Clava antennarum bi-articulata; 9.º articulo 10.º minus latiore. Lateralia capitis basin versus parallela.

Processus abdominis angustus.

Genre très voisin du genre *Europs*, distinct par la structure de la massue des antennes composée d'un article très transversal et d'un article plus large, beaucoup plus long formé à la base d'une partie cornée, lisse, très transversale, enclassant un bouton ovale, pubescent.

53. **Eporus insignis**, n. sp. — *Sat elongatus, parallelus, convexus, vir pubescens, nigro-piceus; pedibus et basi elytrorum rufo-ochraceis; capite parce punctato, antice utrinque impresso, fronte in longitudinem sulcata; prothorace subquadrato, antice transversim et postice quadratim impresso, impressionibus junctis et punctatis, scutello elongato; elytris punctato-striatis, punctis remotis, singulo setam erectam, brevissimamque ferente; abdomine pilis aureis sparsisque oruato.* — Long. 3 mill.

Assez allongé, parallèle, convexe, à peine pubescent, assez

brillant, brun de poix. Premier article des antennes, pattes sauf la base des tibias et élytres, sur un peu plus de la moitié basilaire, d'un jaune ferrugineux, très légèrement obscurci. Tête triangulaire, très éparsement ponctuée; de chaque côté, vers la base des antennes, une impression longitudinale, sur le front un court sillon également longitudinal, bord antérieur obtusément anguleux au milieu. Prothorax sensiblement aussi long que large, presque parallèle, présentant en avant une impression rectangulaire; ponctuation forte, très éparse, plus dense dans les impressions. Ecusson allongé. Elytres ponctués-striés; stries peu profondes; points écartés, chacun donnant naissance à une très courte soie flave dressée. Sur le dessous quelques poils dorés, très épars sur la poitrine, plus serrés sur le milieu de la base du premier segment de l'abdomen et sur le dernier

Assam. Patkai M.^{ts}. Collection A. Fry.

54. *Mimemodes insulare*, n. sp. — *Elongatum, parallelum, subconvexum, nitidulum, alutaceum, parce pubescens, testaceum; capite transverso, parce punctato, antice utrinque oblique profundeque impresso, margine antico subsinuato; prothorace capite angustiore, transverso, basin versus vix angustato, punctato, lateribus crenulatis, angulis anticis rectis, posticis rotundatis; scutello elongato; elytris punctato-striatis; pygidio punctato.* — Long. 2 mill.

Allongé, parallèle, un peu convexe, assez brillant, alutacé testacé. Tête trasversale, éparsement ponctuée, excavée en avant et obliquement impressionnée de chaque côté entre les bases des antennes; epistome subsinué, angles postérieurs aigus saillants. Prothorax plus étroit que la tête, transversal, faiblement rétréci à la base, éparsement ponctué; sur le disque une bande longitudinale lisse, limitée à la base par une ligne de points qui forme une légère dépression; angles antérieurs droits, postérieurs largement arrondis. Ecusson allongé, parallèle, arrondi au sommet. Elytres de la largeur du prothorax, un peu moins de deux fois aussi longs que larges ensemble, ponctués-striés, garnis sur les stries de petits poils dressés. Pygidium ponctué.

Dernier segment de l'abdomen du mâle armé d'un segment supplémentaire.

Sumatra (Deli). Collection A. Grouvelle.

Plus court et proportionnellement beaucoup plus large que *M. Japonum* Reit.

COLYDIDAE.

55. **Atyscus ovatus**, n. sp. — *Ovatus, convexus, nigricans, opacus, setosus; antennis pedibusque rufo-fuscis; capite depresso, flavo-setoso; prothorace transverso, cordiformi, disco fasciculato, lateribus concavis; elytris lineato-setosis, setis nigro vel flavo variegatis.* — Long. 3 mill. $\frac{1}{2}$ à 4 millim.

Ovale, convexe, noirâtre, opaque, garni de soies dressées flaves sur la tête, noires sur le prothorax et variées de noir et de flave sur les élytres. Front déprimé, un peu relevé de chaque côté contre les yeux, ceux-ci garnis de soies dressées. Prothorax transversal, plus large que la tête, cordiforme, concave sur les côtés, portant sur le disque une fascie de soies dressées, non rebordé à la base. Elytres beaucoup plus larges que le prothorax à la base, environ une fois et un quart aussi longs que larges ensemble, couverts de soies noires disposées en lignes et marqués par places de fascies de poils squameux flaves.

Sumatra (Si-Rambé). E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gênes.

56. **Hyberis multifasciculatus**, n. sp. — *Oblongus, convexus, nigricans, flavo-setosus, nigro-fasciculatus; prothorace transverso, vix angustato, tuberculato, disco bi-fasciculato, lateribus carinatis; elytris lineato-punctatis, singulo sex fasciculato, 1.^o-4.^o ante médium, 5.^o et 6.^o post médium.* — Long. 4 mill. $\frac{1}{2}$.

Oblong, convexe, noirâtre, garni de soies flaves et de fascies formées de soies dressées, noires. Tête granuleuse, impressionnée de chaque côté près des yeux. Prothorax transversal, peu rétréci à la base, subcordiforme, couvert de granulations assez serrées et en partie déprimées; sur le disque deux petites fascies noires; côtés dentés, explanés; soies flaves plus ou moins couchées. Elytres beaucoup plus larges que le prothorax, à peine plus longs que larges ensemble, assez fortement ponctués en lignes.

portant chacun six fascies noires; la première près de l'écusson, la 2.^{me} en dehors, un peu plus éloignée de la base, la 3.^{me} encore plus loin de la base mais plus près de la suture que la première, la 4.^{me} sur le disque, un peu avant le milieu, la 5.^{me} et la 6.^{me} sur une ligne oblique vers le dernier tiers.

Sumatra (Si-Rambé). E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gènes.

57. **Hyberis crassus**, n. sp. — *Oblongus, convexus, nigro-brunneus, flavo-setosus, pube ochracea plus minusve densata vestitus; prothorace transverso, cordato, lateribus dentatis subconcavo-explanatis; elytris tenuiter lineato-striatis, ochraceo-fasciculatis.* — Long. 3 mill. $\frac{1}{2}$.

Oblong, convexe, brunâtre, garni de soies dressées flaves et de poils squameux plus ou moins condensés en fascies sur les élytres. Front subléprimé, granuleux. Prothorax très transversal, cordiforme, sans impressions sur le disque, légèrement concave sur les côtés; bords latéraux dentés. Elytres beaucoup plus larges que le prothorax à la base, environ une fois et un tiers aussi longs que larges ensemble, beaucoup plus larges que le prothorax à la base, finement striés, intervalles plans presque lisses. Soies dressées disposées en ligne sur les stries. Pubescence formant deux fascies bien marquées sur le 6.^{me} intervalle à la naissance de la déclivité apicale de l'élytre et une série de lignes fasciées plus ou moins marquées sur cette déclivité et à la base de l'élytre.

Sumatra (Si-Rambé). E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gènes.

58. **Hyberis brevicornis**, n. sp. — *Ovatus, convexus, ater, nigro flavoque setosus, flavo-fasciculatus; antennis basin prothoracis haud attingentibus; prothorace transverso, vix cordato, tuberculato, lateribus dentatis; elytris lineato-tuberculatis, ad apicem ex parte flavo-setosis; singulo bi-fasciculato, 1.° fasciculo dorsali, prope basin, inter suturam et marginem lateralem, 2.° magis externo, ad tertiam partem apicalem.* — Long. 3 mill.

Ovale, convexe, noir, garni de soies dressées, noires plus ou moins flaves vers le sommet des élytres. Antennes relativement

courtes n'atteignant pas la base du prothorax. Front subdéprimé, granuleux. Prothorax très transversal, à peine cordiforme, denté sur les côtés, couvert de granulations assez fortes, serrées et peu déprimées, disque sans fossette. Elytres environ une fois et un tiers aussi longs que larges ensemble, beaucoup plus larges que le prothorax à la base, garnis de granulations disposées en lignes et portant respectivement une soie dressée. Sur le disque, pas loin de la base une fascie de soies dressées flaves, vers le sommet une seconde fascie analogue plus rapprochée du bord latéral que de la suture et quelques soies flaves plus ou moins denses formant une bande transversale peu distincte entre les deux fascies apicales.

Sumatra (Si-Rambé). E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gênes.

59. *Hyberis Bouchardi*, n. sp. — *Ovatus, convexus, niger, nigrosetosus, flavo-fasciculatus; prothorace tuberculato, tuberculis depressis, lateribus dentatis, disco foveolato; elytris lineato-tuberculatis, singulo tri-fasciculato, 1.° fasciculo dorsali, prope scutellum, 2.° et 3.° ad apicem.* — Long. 4 mill. $\frac{1}{4}$.

Ovale, convexe, noir, garni de soies dressées foncées et de fascies de poils flaves. Front subdéprimé, rugueux. Prothorax transversal, cordiforme, chargé de tubercules serrés assez gros, déprimés, foveolés sur le disque, bords latéraux dentés. Elytres beaucoup plus larges que le prothorax, environ une fois et un tiers aussi longs que larges ensemble, garnis de tubercules, pas très développés, assez irréguliers disposés en lignes et donnant naissance à des soies dressées; sur chaque élytre trois fascies: la première dans l'angle scutellaire de l'élytre, les deux autres sur une ligne oblique placée vers le dernier quart de l'élytre.

Sumatra (Palembang). Collection Grouvelle.

60. *Hyberis fasciculatus*, n. sp. — *Ovatus, convexus, nigricans, fulvo-pilosus et fasciculatus; prothorace bi-fasciculato, rugoso, lateribus longe dentatis; elytris longe pilosis, singulo bi-fasciculato, 1.° fasciculo dorsali, juxta scutellum, 2.° suturali circa medium, lateribus dentatis.* — Long. 5 à 6 mill.

Ovale, convexe, noirâtre, garni de longs poils fauves espacés

et portant cinq fascies de soies fauves dressées. Front granuleux, concave. Prothorax transversal, peu rétréci à la base, peu fortement granuleux, assez longuement denté sur les côtés; marge antérieure saillante sur la tête, légèrement déprimée dans son milieu, sur le disque en avant du milieu, deux saillies subpyramidales, disposées sur une ligne transversale et portant chacune une fascie de soies fauves, dressées; en arrière de chacune de ces fascies un petit espace lisse. Elytres environ une fois et demie aussi longs que larges ensemble, beaucoup plus larges que le prothorax à la base, subparallèles à la base, peu lisses, garnis en dehors des longs poils fauves, de courtes soies dressées, disposées en lignes et de trois fascies de soies fauves, les deux premières placées respectivement sur chaque élytre, discoïdales assez près de l'écusson, la 3.^{me} suturale, commune, inclinée en arrière, sur le milieu du disque; bords latéraux dentés, ciliés.

Sumatra (Si-Rambé). E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gènes.

61. **Hyberis Modiglianii**, n. sp. — *Ovatus, convexus, niger, tuberculatus, setosus; prothorace cordiformi, convexo, disco in longitudinem canaliculato, canaliculo antice posticeque abbreviato, lateribus dentatis, explanatis, tuberculis ex parte depressis; elytris ovatis, tuberculis plus minusve elevatis.* — Long. 4 mill. $\frac{1}{2}$.

Ovale, convexe, noir, chargé de tubercules portant chacun une soie dressée. Antennes rougeâtres, foncées. Front presque déprimé, obliquement sillonné de chaque côté près des yeux. Prothorax transversal, cordiforme, subpyramidal, coupé sur le milieu du disque par une fossette longitudinale, tubercules assez serrés, déprimés, marges latérales explanées, bords latéraux dentés; angles antérieurs aigus, saillants en avant. Elytres à peine une fois et demie aussi longs que larges ensemble dans la plus grande largeur, chargés de gros tubercules peu serrés, disposés en lignes entremêlées de tubercules plus petits. Pattes noirâtres, tarsi d'un roux enfumé.

Sumatra (Si-Rambé). E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gènes.

62. **Labromimus Raffrayi**, n. sp. — *Oblongus, dense griseo-squamosus; fronte concava; prothorace transverso, lateribus rotundatis, setoso-ciliatis, marginibus lateralibus concavis, disco elevato quadri-tuberculato, duobus primis tuberculis juxta marginem anticum, duobus ultimis discoidalibus, tuberculis fasciculatis; lateribus elytrorum setoso-ciliatis, sutura tectiformi, utrinque basin versus carina obtusa arcuata cum sutura conjuncta.* — Long. 4 mill. $\frac{1}{2}$.

Oblong, densément couvert de squamules d'un gris bianchâtre, entremêlées de soies dressées, courtes et épaisses de nuance claire. Antennes et pattes d'un roux un peu grisâtre. Tête transversale, front concave, yeux garnis de soies dressées. Prothorax plus de deux fois plus large que long, cotés arrondis, ciliés; marges latérales largement concaves; disque élevé, portant quatre tubercules fasciculés, les deux premiers plus petits, très rapprochés contre le bord apical, les deux autres sur le disque, un peu plus éloignés. Elytres subparallèles, à peine plus larges que le prothorax, environ une fois et demie aussi longs que larges, ciliés sur les côtés, élevés en toit vers la suture; crête suturale s'écartant de la suture vers le premier cinquième de la longueur pour former une saillie arquée allant rejoindre la base auprès de l'écusson.

Sumatra (Si-Rambé). E. Moligliani. Collection du Musée Civique de Gênes. Singapore. Collection A. Grouvelle.

63. **Labromimus squamosus**, n. sp. — *Oblongus, convexus, dense isabellino-squamosus, fasciculatus; prothorace transverso, antice posticeque angustato; quadri-fasciculato, duobus primis fasciculis prope marginem anticum, duobus alteris discoidalibus, post medium; elytris tenue striatis, singulo septies fasciculato: 1.° fasciculo nigro, prope scutellum; 2.° humerali; 3.° nigro, elongato, discoidal, prope suturam; 4.° nigro, parvo, infra tertium; 5.° et 6.° cinereis, parvis, prope quartum; ultimo parvo, cinereo, apicali.* — Long. 5 mill.

Oblong, convexe, couvert de squamules d'un brun clair masquant la couleur du tégument. Front légèrement concave, impressionné de chaque côté vers la naissance des antennes. Prothorax environ trois fois aussi large que long, plus rétréci au sommet qu'à la base, fortement arqué sur les côtés, garni de

quatre fascies de soies dressées, les deux premières rapprochées, contre la marge antérieure, les deux autres plus écartées, sur le disque un peu au delà du milieu. Ecusson petit, ovale. Elytres environ une fois et demie aussi longs que larges ensemble, un peu tectiformes, lorsqu'on les voit de profil, finement striés, chacun garni de sept fascies de soies dressées: la 1.^{re} noire près de l'écusson, la 2.^{me} humérale, la 3.^{me} allongée, noire contre la suture, sur la saillie du profil longitudinal, la 4.^{me} petite, noire, un peu au delà de la 3.^{me}, la 5.^{me} et la 6.^{me} grises, petites, au même niveau que la 4.^{me} et la 7.^{me} grise, petite, vers le sommet. Bords latéraux du prothorax et des élytres frangés de petites soies dressées.

Sumatra (Si-Rambé). E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gênes.

64. *Bupala elongata*, n. sp. — *Elongata, parallela, modice convexa, subnitida, castanea, flavo-setosa; capite prothoraceque granosis, hoc vix elongato, lateribus tenuiter marginatis, obtuse crenulatis, basi marginata; elytris lineato-punctatis.* — Long. 4 mill.

Allongé, parallèle, médiocrement convexe, un peu brillant, brun marron, garni de soies dressées, flaves. Antennes courtes de 10 articles, terminées par un bouton partagé transversalement en deux zones, l'une glabre, l'autre pubescente; 3.^{me} article un peu moins longs que les 4.^{me} et 5.^{me} réunis. Front subdéprimé impressionné de chaque côté à la naissance des antennes, couvert de granulations assez serrées, marge antérieure arrondie; yeux glabres placés un peu en avant des angles postérieurs de la tête. Prothorax un peu plus large que la tête, un peu plus long que large, trapézoïdiforme, un peu rétréci à la base, granuleux, parfois vaguement impressionné sur le disque; base rebordée, bords latéraux rebordés, faiblement crénelés. Ecusson petit, ovale. Elytres environ trois fois plus longs que larges ensemble, ponctué-striés; portant sur chaque point une soie dressée. Dessous finement rugueux; sillons antennaires courts, convergents, en partie masqués par le développement latéral de la pièce basilaire; saillie prosternale marquée, tibia non dentés à l'extrémité, non épineux.

Sumatra (Si-Rambé). E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gênes.

Nous rapportons, avec quelque doute cette espèce au genre *Bupala* Pasc.

65. **Neotrichus crassus**, n. sp. — *Elongatus, parallelus, convexus, setosus, nigricans; capite granoso, oculis setosis; prothorace subquadrato, basin versus angustato, fortiter granoso, in longitudinem praesertim antice, late subcanaliculato; lateribus serratis; elytris lineato-setosis.* — Long. 4 mill.

Allongé, subcylindrique, noirâtre, garni de soies dressées d'un gris jaunâtre. Tête et prothorax granuleux. Front échancré par les yeux, relevé de chaque côté en avant de ceux-ci. Prothorax à peu près aussi long que large en avant, rétréci à la base, couvert de fortes granulations laissant sur le disque, surtout en avant, un espace longitudinal lisse qui forme comme un large sillon; côtés épineux. Elytres à peine deux fois aussi longs que larges ensemble; garnis de soies dressées, disposées en lignes sur de fines stries ponctuées; intervalles en raison de la forme de la ponctuation peu unis. Pattes noirâtres.

Sumatra (Si-Rambé). E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gênes.

Voisin du *N. serratus* Sharp., mais moins allongé et beaucoup plus fortement granuleux sur le prothorax.

66. **Nematidium angustatum**, n. sp. — *Filiforme, subcylindricum, piceum, subnitidum, elytris leviter striato-punctatis, intervallo suturali ad apicem leviter excavato.* Long. 7 mill.

Très allongé, filiforme, subcylindrique, assez brillant, brun. Antennes rougeâtres, massue foncée. Tête suborbiculaire, convexe, éparsément ponctuée; marge antérieure, échancrée, relevée de chaque côté de l'échancrure en deux courtes élévations caréniformes, mais très obtuses. Prothorax un peu plus d'une fois et demie plus long que large, éparsément, mais plus fortement ponctué que la tête. Elytres environ cinq fois plus longs que larges, assez finement ponctués-striés, chacun ayant à l'extrémité une dépression concave sur l'intervalle sutural.

Sumatra (Si-Rambé). E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gènes.

Distinct du *N. posticum* Pasc. par l'absence de houppe poilue au sommet.

67. **Penthelispa angusticollis**, n. sp. — *Elongata, subnitida, castanea; antennis crassis, brevibus; capite prothoraceque sat dense punctatis, fronte convexiuscula, utrinque basin versus antennarum elevata et fortiter impressa; prothorace subelongato, disco impresso, angulis anticis productis, lateribus basique marginatis; elytris prothorace latioribus, striato-punctatis, intervallis striis angustioribus, lineato-punctulatis.* -- Long. 4 mill.

Allongé, subparallèle, un peu brillant, marron clair. Antennes courtes, épaisses, avant dernier article une fois et demie plus large que le précédent. Tête assez fortement et densément ponctuée, relevée en un fort pli et impressionnée à la base de chaque antenne. Prothorax un peu plus long que large, légèrement plus large que la tête, plus rétréci à la base qu'au sommet, plus densément et moins fortement ponctué que la tête; angles antérieurs saillants; disque impressionné; bords latéraux et base étroitement rebordés, ceux-ci presque crénelés. Elytres plus larges que le prothorax, fortement ponctués-striés; intervalles plus étroits que les stries, chacun avec une ligne de très petits points; sommet légèrement explané de chaque côté, rebordé par un bourrelet.

Sumatra (Palembang). Collection Grouvelle. Engano (Malaconni). E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gènes.

68. **Bothrideres Modiglianii**, n. sp. — *Oblongus, modice convexus, fusco-rufus; capite dense punctato; prothorace subtransverso, basin versus angustato, parce punctato, in disco sulco profundo spatium quadratum, elongatum et parcissime punctulatum includente, lateribus sulci antice oblique productis, postice sulco minimo basi junctis; elytris striato-punctatis, tri-costatis, intervallis punctulatis.* — Long. 3 mill.

Oblong, médiocrement convexe, brun rougeâtre. Tête densément et assez fortement ponctuée. Prothorax transversal, rétréci à la base, à peine rebordé sur les côtés, peu densément ponctué,

marqué sur le disque, dans la longueur d'un profond sillon enfermant un espace rectangulaire, très éparsément et finement ponctué; cotés du sillon prolongés obliquement aux angles antérieurs et réunis à la base vers les angles postérieurs de l'espace rectangulaire par un faible sillon oblique. Elytres ponctués-striés, chacun avec les trois carènes normales; intervalles des stries éparsément pointillés.

Sumatra (Siboga). E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gênes.

69. **Bothrideres Bouchardi**, n. sp. — *Oblongus, subconvexus, nigrofuscus; singulo elytro in longitudinem rufo-castaneo vittato; prothorace subquadrato, basin versus angustato, dense et sat fortiter punctato, in disco sulco profundo spatium quadratum, subelongatum et parce punctatum includente et impressione triangulari basi juncto, lateribus lineae dorsalis antice posticeque prolatis; elytris striatis, tricarinatis.* — Long. 4 mill.

Oblong, médiocrement convexe, noir avec une bande longitudinale d'un roux marron sur chaque élytre. Tête densément et assez fortement ponctuée, antennes rougeâtres. Prothorax à peu près aussi long que large, rétréci à la base, densément et assez fortement ponctué, finement rebordé sur les côtés, avec un petit calus dans le milieu du rebord, marqué sur le disque d'un profond sillon enfermant un espace rectangulaire, presque carré, moins fortement ponctué que le reste de la surface; cotés de ce sillon prolongés en avant et en arrière, base réunie au milieu à la base du prothorax par une profonde impression triangulaire. Elytres striés, chacun avec trois côtes élevées.

Sumatra (Palembang). Collection A. Grouvelle.

Remarquable par la forme de l'impression discoïdale du prothorax.

70. **Cerylon Bouchardi**, n. sp. — *Oblongum, convexum, nitidum, pilis erectis parcius vestitum, castaneum; 1.º articulo antennarum incrassato, arcuato, 3.º elongato; clava oblonga, pubescente; fronte bi-impressa; prothorace transverso, sat dense punctato, basi scutellum vix marginato, elytris punctato-striatis.* — Long. 1 mill. $\frac{3}{4}$.

Ovale, convexe, brillant, marron, garni de longs poils dressés très espacés. 1.^{er} article des antennes épaissi, recourbé, 3.^{me}

deux fois plus long que le 2.^{me}, 4 à 9 serrés, massue ovale pubescente. Front bi-impressionné. Prothorax transversal, grossièrement et peu densément ponctué, à peine rebordé dans le milieu de la base. Elytres ponctué-striés.

Sumatra (Palembang). Collection Grouvelle.

Espèce voisine de *C. punctum* Grouv. mais plus grosse, plus densément ponctué, et nettement séparée par l'absence de sillon transversal devant la base.

71. **Cerylon braminum**, Mots. — Nous rapportons à cette espèce, d'après la description, une série de *Cerylon* récoltés à Engano, à Java et à Sumatra. Les exemplaires des deux dernières provenances ont une ponctuation d'une manière générale moins accentuée. Tous sont caractérisés par le 2.^{me} article des antennes très court, le 3.^{me} une fois et demie aussi long que large, les 4.^{me} à 9.^{me} serrés; le prothorax bi-impressionné à la base, rebordé à la base dans son milieu; les stries des élytres parallèles à la suture, et la strie suturale atténuée à la base. Il ne nous semble pas possible de séparer la forme à ponctuation plus faible.

72. **Cerylon piliger**, n. sp. — *Oblongum, convexum, nitidum, piceum, pubescens*; 3.^o articulo elongato, 2.^o longiore; prothorace transverso, punctato, antice posticeque angustato, lateribus rotundatis; elytris punctato-striatis, intervallis vix perspicue punctulatis; tibiis anticis ad apicem dilatatis. — Long. 2 mill.

Oblong, convexe, brillant, brun de poix, couvert d'une pubescence assez dense un peu lanugineuse. Antennes grêles, 1.^{er} article un peu plus long que large, 3.^{me} allongé, plus long que le 2.^{me}, 4.^{me} à 8.^{me} transversaux, serrés, 9 détaché des précédents, un peu plus large, 10.^{me} ovale terminé par un bouton pubescent. Prothorax d'un tiers plus large que long, rétréci à la base et au sommet, un peu éparsément ponctué; côtés arrondis, rebordés, base non rebordée, saillante dans le milieu vers l'écusson. Ecusson en triangle curviligne. Elytres environ deux fois aussi longs que larges, un peu plus larges que le prothorax à la base, anguleux aux épaules, ponctué-striés; stries parallèles à la suture; intervalles à peine visiblement

pointillés; tibias antérieurs brusquement dilatés dans leur moitié apicale.

Sumatra. Collection Grouvelle.

73. **Cerylon exiguum**, n. sp. — *Oblongum, vix convexum, nitidum, pubescens, rufo-castaneum*; 2.^o articulo antennarum elongato, 3.^o quadrato, 4-9 transversis, prothorace subquadrato, parce, profunde punctato; elytris profunde punctato-striatis, punctis irregularibus, intervallis leviter asperatis. — Long. 1 mill. $\frac{1}{2}$.

Oblong, un peu convexe, brillant, roux-marron, garni d'une pubescence formée de poils dressés, de longueur moyenne assez nombreux. Antennes assez épaisses, deuxième article allongé, troisième aussi long que large, 4 à 9 transversaux, massue oblongue, base lisse, sommet pubescent partagé en deux zones par une suture transversale. Prothorax d'un quart plus large que long, profondément et assez éparsément ponctué, bords latéraux régulièrement arqués, base tronquée, non rebordée, angles postérieurs obtus. Ecusson subpentagonal. Elytres un peu plus larges que le prothorax à la base, obtus aux épaules, plus de deux fois plus longs que larges ensemble, fortement ponctué-striés; stries parallèles à la suture; points des stries un peu irréguliers, intervalles un peu rugueux. Dessous éparsément ponctué, mésosternum impressionné, pattes larges, angle apical externe obtus.

Engano (Malaconni). E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gênes.

74. **Cerylon Beccarii**, n. sp. — *Oblongum, subdepressum, nitidum, glabrum, rufo-castaneum; sutura elytrorum leviter infuscata; antennis subincrassatis; articulo 2.^o et 3.^o subaequalibus, clava orbiculari; capite parce punctulato; prothorace transverso, lateribus subparallelis, antice arcuatis, disco sat parce punctato, ante scutellum subelevato; elytris striato-punctatis, striis dorsalibus basin versus intus curvatis, lateralibus attenuatis.* — Long. 2 mill.

Oblong, allongé, presque déprimé, brillant, glabre, roux-marron, suture des élytres légèrement rembrunie. Antennes un peu épaisses, 1.^{er} article épaissi, subcarré, 2.^{me} et 3.^{me} subégaux, massue orbiculaire, testacé clair. Tête éparsément pointillée. Pro-

thorax environ une fois et un tiers aussi large que long, assez éparsément ponctué sur le disque, légèrement relevée à la base devant l'écusson, bords latéraux parallèles arqués en dedans, un peu avant le sommet. Ecusson lisse, demi circulaire, un peu enfoncé contre la base du prothorax. Elytres un peu plus larges que le prothorax à la base, obtusément anguleux aux épaules, environ deux fois aussi longs que larges ensemble, ponctués-striés, stries dorsales réfléchies en dedans à la base, atteignant presque le sommet, latérales presque nulles; intervalles lisses. Tibias larges, obliquement tronqués au sommet.

Sumatra, Mont Singalang. O. Beccari. Collection du Musée Civique de Gênes.

75. **Cerylon angulosum**, n. sp. — *Oblongum, vix convexum, nitidum, castaneum, pubescens*; 2.° articulo antennarum subquadrato; capite parce punctato; thorace transverso, lateribus subparallelis, disco profunde sat parce punctato, basi haud marginata; scutello subsemicirculari; elytris punctato-striatis, intervallis uni-punctato-lineatis, humeris dentatis; tibiis latis, extus ante-apicem angulosis. — Long. 2 mill.

Oblong, peu convexe, brillant, marron, téguments garnis de poils dressés, peu serrés, assez longs, moins rares sur les côtés que sur le disque. Antennes un peu épaisses, deuxième article presque carré, troisième un peu plus court, 4.^{me} à 9.^{me} serrés, transversaux; massue ovale, opaque et fortement pubescente sur sa moitié apicale. Tête éparsément ponctué. Prothorax environ d'un tiers plus large que long, plus fortement ponctué que la tête, côtés rebordés, subparallèles, dans leur milieu, arqués aux extrémités, base non rebordée. Ecusson presque demi-circulaire. Elytres un peu plus larges que le prothorax à la base, dentés aux épaules, un peu plus de deux fois plus longs que larges ensemble à la base, ponctués-striés; chaque intervalle avec une ligne de points plus fins; strie suturale bien marquée au sommet, les autres atténuées. Tibias larges, anguleux au bord externe un peu avant l'extrémité. Dessous éparsément ponctué.

Sumatra, Si-Rambé. Engano, Malaconni. E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gênes.

76. **Cerylon punctum**, n. sp. — *Oblongo-ovatum, concavum, nitidum, rufo-castaneum, pube parce longaque vestitum*; 1.^o articulo antennarum incrassato, arcuato, 3 elongato, clava oblonga; prothorace transverso, parce profunde punctato, basi marginata; elytris prothorace latioribus, profunde punctato-lineatis, substriatis. Subtus plus minusve profunde punctatum. — Long. 1 mill. $\frac{1}{3}$.

Ovale, convexe, brillant, roux marron plus ou moins clair, garni de poils dressés, assez longs, plutôt rares. Premier article des antennes épaissi, arqué, 3.^{me} deux fois plus long que le 2.^{me}, 4 à 9 serrés; massue ovale, pubescente sur sa moitié apicale. Prothorax environ une fois et un tiers aussi large que long, déclive en avant, éparsément et fortement ponctué, marge antérieure profondément échancrée, bords latéraux arqués, faiblement sinués vers les angles postérieurs qui sont droits, base rebordée d'une ligne de gros points placés dans un sillon. Ecusson lisse, pentagonal, faiblement transversal. Elytres un peu plus larges que le prothorax à la base, un peu plus longs que larges ensemble dans leur plus grand diamètre, grossièrement et profondément ponctués en lignes. Prosternum densément ponctué, métasternum éparsément et faiblement ponctué sur le disque, fortement et densément sur les côtés, rebordé en avant par une ligne de points; premier segment abdominal grossièrement et fortement ponctué; une ligne transversale de points sur les autres.

Sumatra. Deli, Si-Rambé. Collection Grouvelle et Musée Civique de Gênes.

77. **Cerylon pilosum**, n. sp. — *Elongato-ovatum, subconvexum, castaneum, parce pilosum*; antennis crassis, articulo 2.^o quadrato, 3.^o transverso; prothorace subquadrato, antice angustato, parce profundeque punctato; elytris punctato-striatis, intervallis punctato-lineatis. — Long. 2 mill. $\frac{1}{2}$.

Ovale, allongé, subparallèle, faiblement convexe, chatain, pubescence formée de poils dressés, très espacés. Antennes épaisses, deuxième article sensiblement aussi long que large, troisième transversal, massue oblongue. Prothorax presque aussi long que large, subparallèle à la base, rétréci au sommet; marge anté-

rieure échancrée en arc; angles antérieurs presque droits; ponctuation profonde assez espacée. Elytres subparallèles, plus de deux fois plus longs que larges, ponctués-striés, stries superficielles; intervalles des stries avec une ligne de points plus ou moins serrés.

Meetan (Tenasserim). L. Fea. Collection du Musée Civique de Gènes.

Pseudocerylon, n. gen.

Antennae 10 articulatae, clava uni-articulata.

Scutellum minutissimum.

Primum segmentum abdominis elongatum, caeteris, brevibus, aequalibus.

Coxae anticae distantes.

Nouveau genre du groupe des Cerylonini; distinct des *Cerylon* proprement dits par sa forme courte, ses hanches antérieures aussi écartées que les intermédiaires et les postérieures et par les dimensions relatives du 2.^{me} segment abdominal qui est court, pas plus long que les suivants.

78. **Pseudocerylon trimaculatum**, n. sp. — *Oblongum, curvum, convexum, nitidum, glabrum, nigro-piceum; antennis pedibusque rufochraceis, singulo nigro tri-maculato, 1.^a macula suturali, 2.^a laterali, 3.^a apicali; prothorace transverso parce punctato, antice utrinque impresso, lateribus incrassatis, levibus; basi medio angulatim producta; scutello minutissimo, elytris lineato-punctatis, substriatis.* — Long. 2 mill. $\frac{1}{2}$.

Oblong, court, convexe, lisse, brillant, noir de poix, antennes et pattes roussâtres, élytres roux jaunâtre, chacun avec trois taches noires, la première suturale avant le milieu, la 2.^{me} latérale un peu après le milieu, la 3.^{me} apicale. Deuxième article des antennes un peu plus long que large, 3.^{me} allongé, 4 à 9 épaissis peu à peu, massue ovale terminée par une calotte opaque pubescente. Tête et prothorax assez fortement et éparsément ponctués. Prothorax environ de moitié aussi long que large dans son plus grand diamètre, déclive en avant, largement échancré

au sommet, mais paraissant tronqué lorsqu'il est vu de dessus; angles antérieurs largement arrondis, postérieurs droits, bords latéraux en bourrelet lisses; sur le disque, de chaque côté, devant le milieu une impression; base saillante en angle obtus. Elytres environ aussi longs que larges ensemble, ponctués en ligne, presque striés.

Sumatra (Si-Rambé). E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gênes.

79. **Pseudocerylon bicolor**, n. sp. — *Oblongum, convexum, nitidum, glabrum, nigro-piceum, antennis pedibusque rufo-fuscis, elytris rufo-ferrugineis, singulo bi-maculato, 1.^a macula discoidali, 2.^a apicali; capite prothorace parce profunde punctato, hoc antice angustato, apice emarginato, basi medio angulatim producto; scutello minutissimo, elytris punctato-striatis.* — Long. 3 mill.

Oblong, convexe, brillant, glabre, noir de poix, antennes et pattes roux enfumé, élytres roux ferrugineux, chacun avec deux taches noires, la première arrondie discoïdale, la 2.^{me} apicale. Antennes assez grêles, épaissies peu à peu jusqu'à la massue, 2.^{me} article un peu plus long que large, 3.^{me} allongé, massue ovale, allongée, terminée par une calotte opaque pubescente. Tête éparsément ponctuée. Prothorax plus fortement ponctué que la tête, transversal, rétréci en avant, bord antérieur échancré. latéraux presque droits, arrondis en avant; angles antérieurs à peine marqués, marges latérales lisses, base anguleusement saillante sur les élytres. Ecusson très petit. Elytres ovales, environ une fois et demie aussi longs que larges ensemble, à la base de la largeur du prothorax, présentant leur plus grande largeur vers le premier quart de la longueur, ponctués en lignes, strie suturale marquée vers le sommet. Crochet des tarsi à peine plus long que l'ensemble des articles précédents.

Sumatra (Si-Rambé). E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gênes.

80. **Pseudocerylon Bouchardi**, n. sp. — *Ovatum, curtum, convexum, nitidum, glabrum, rufo-castaneum; capite prothoraceque parce profundeque punctatis; thorace transverso, apice truncato, angulis anticis late rotundatis, posticis subrectis, marginibus lateralibus*

laevibus, stricte marginatis; scutello minutissimo, elytris profunde lineato-punctatis, ad apicem substriatis. — Long. 1 mill. $\frac{1}{2}$.

Ovale, court, convexe, lisse, brillant, roux marron. Antennes allongées, épaissies progressivement vers la massue qui est formée d'un gros article ovale, terminé au sommet par un bouton pubescent; 2.^{me} article à peine plus long que large, 3.^{me} un peu plus long. Tête profondément et un peu éparsément ponctuée. Prothorax beaucoup plus large que la tête, moins de moitié moins long que large à la base, déclive en avant, tronqué en avant lorsqu'il est vu du dessus, largement arrondi aux épaules, plus fortement et plus éparsément ponctué que le prothorax; marges latérales lisses, finement rebordées. Ecusson très petit. Elytres environ aussi longs que larges ensemble dans leur plus grand diamètre, un peu plus larges que le prothorax, ponctués en lignes, substriés au sommet; intervalles des lignes ponctués très larges, profil latéral des élytres ne se raccordant avec le profil du prothorax. Dessous du thorax grossièrement ponctué; métasternum et premier segment abdominal éparsément ponctués.

Sumatra, Palembang. Collection Grouvelle. Récolté par Mr. Bouchard.

81. **Pachylon Gestroi**, n. sp. — *Oblongum, convexum, nitidum, glabrum, nigro-piceum; prothorace transverso, marginibus lateralibus valde punctatis, late explanatis, elytris punctato-striatis.* — Long. 7 mill.

Oblong, convexe, brillant, glabre, noir de poix. Tête éparsément ponctuée. Prothorax environ de moitié aussi long que large dans son plus grand diamètre, côtés arrondis, finement rebordés, marges latérales déclives contre le rebord externe, plus largement explanées, fortement ponctuées, disque éparsément et beaucoup plus faiblement ponctué. Ecusson demi-circulaire. Elytres assez finement ponctués-striés.

Sumatra (Si-Rambé). E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gènes.

82. **Cautomus crassus**, n. sp. — *Oblongus, modice convexus, fusco-castaneus, setosus; capite prothoraceque densissime punctatis;*

hoc in disco minute bi-tuberculato; elytris lineato-punctatis, lineis dorsalibus parum regularibus. -- Long. 2 mill.

Oblong, peu convexe, marron un peu foncé, assez brillant surtout sur les élytres, garni de soies dressées claires, assez longues, disposées en lignes sur les élytres. Antennes n'atteignant pas la base du prothorax, assez grêles terminées par une massue allongée, formée par un article pubescent terminé par un bouton oblong; 1.^{er} article presque carré, plus large que les suivants; 2.^{me} et 3.^{me} plutôt plus d'une fois et demie aussi longs que larges, 8 et 9 élargis progressivement. Tête et prothorax très densément ponctués. Prothorax très transversal, très faiblement rétréci à la base, fortement au sommet; bords très étroitement rebordés, obtusément crénelés, disque portant deux petits tubercules brillants. Ecusson subsemi-circulaire, lisse. Elytres à peine une fois et un tiers aussi longs que larges ensemble, ponctués en lignes serrées, peu régulières sur le disque contre la suture. Ponctuation des élytres plus forte que celle du prothorax.

Sumatra (Si-Rambé). E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gènes.

83. **Cautomus striatus**, n. sp. — *Oblongus, modice convexus, brunneo-castaneus, setosus, capite prothoraceque dense punctatis; elytris lineato-punctatis, lateribus sat fortiter elevatis.* — Long. 1 mill. $\frac{1}{2}$.

Oblong, médiocrement convexe, brun marron, garni de courtes soies dressées, claires disposées en lignes sur les élytres. Antennes courtes, rougeâtres, terminées par une massue analogue à celle du *C. crassus* Grouv. Tête et prothorax densément ponctués. Prothorax très transversal, à peine rétréci à la base, plus fortement au sommet; bords latéraux finement rebordés, à peine crénelés; base étroitement rebordée. Ecusson demi-circulaire. Elytres environ une fois et un tiers aussi longs que larges ensemble, couverts d'une ponctuation disposée en lignes serrées, intervalles alternes faiblement relevés sur le disque, plus fortement sur les côtés.

Sumatra (Ajer Mantior). O. Beccari. Collection du Musée Civique de Gènes.

84. **Cautomus singularis**, n. sp. — *Oblongus, modice convexus, castaneus, setosus; antennis pedibusque rufo-castaneis; prothorace satís parce punctato; elytris lineato-punctatis, intervallis alternis subelevatis.* — Long. 3 mill. $\frac{1}{2}$.

Oblong, médiocrement convexe, assez brillant, garni de soies claires, peu serrées, disposées en lignes sur les élytres, marron; pattes et antennes plus rougeâtres. Antennes n'atteignant pas la base du prothorax, 1.^{er} article plus long que large, beaucoup plus large que les suivants; 2 à 4 à peine une fois et demie aussi longs que larges, massue allongée pubescente terminée par un bouton oblong. Tête fortement ponctuée, triangulaire, saillante en avant en forme d'éperon. Prothorax fortement, mais assez éparsément ponctué, moins large au sommet qu'à la base, présentant la plus grande largeur avant le milieu; bords latéraux étroitement rebordés, faiblement crénelés. Ecusson subdemi-circulaire. Elytres environ d'une fois et demie aussi longs que larges ensemble, ponctués en lignes, serrées, intervalles alternes faiblement relevés. Tibias antérieurs élargis dans la moitié apicale, intermédiaires dilatés dans le milieu de la tranche externe, postérieurs dilatés dans le milieu de la tranche interne, assez brusquement rétrécis avant le sommet. Palpes maxillaires très allongés. Dernier segment de l'abdomen fortement échancré au sommet, pourtour de l'échancrure finement granuleux.

Sumatra (Si-Rambé). E. Modigliani. Collection du Musée Cinique de Gènes.

La forme si particulière de la tête de cet insecte lui donne une physionomie toute spéciale qui rappelle celle de certains acarins.

CUCUJIDAE.

85. **Inopeplus frater**, n. sp. — *Depressus, nitidus, niger; elytris vage dilutioribus; capite sat dense fortiterque punctato; prothorace cordiformi, capite fortius parciusque punctato; elytris parce punctatis.* — Long. 3 mill.

Déprimé, brillant, noir, vaguement plus clair sur les élytres. Antennes à peine rougeâtres à la base. Tête densément et assez

fortement ponctuée, sans impression transversale entre les bases des antennes. Prothorax corliforme, plus fortement et plus éparsément ponctué que la tête. Elytres plus longs que larges ensemble, laissant à découvert les deux derniers segments de l'abdomen, très éparsément et assez fortement ponctués.

Sumatra (Deli). Collection Grouvelle; (Si-Rambé). E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gênes.

86. **Laemophloeus Mariae**, n. sp. — *Ovatus, vix convexus, nitidus, glaber, testaceus, elytris circa scutellum et medio disci infuscatis; antennis sat elongatis ad apicem sensim incrassatis, articulo 2.º et 3.º subaequalibus, ultimo elongato; margine antico capitis tri-sinuato, fronte antice inter bases antennarum marginata, utrinque oblique striata; prothorace transverso, utrinque in longitudinem, profunde striato, striis antice vix attenuatis; scutello triangulari; elytris ovatis, ad apicem conjunctim rotundatis, stria humerali et suturali impressis, prima basin versus secunda ad apicem attenuatis, lateribus late explanatis.* — Long 2 mill. à 2 mill. $\frac{1}{3}$.

Ovale, à peine convexe, brillant, glabre, testacé, élytres rembrunis autour de l'écusson et sur le disque vers le milieu. Antennes assez allongées, épaissies progressivement vers le sommet, deuxième et troisième articles subégaux, dernier très allongé. Bord antérieur de la tête tri-sinué, très rapproché du bord antérieur du front limité au niveau de la base des antennes par une carène, sur le disque deux stries obliques assez allongées. Prothorax deux fois aussi long que large, profondément strié de chaque côté, stries presque incomplètes au sommet; marges latérales un peu concaves, rebords arrondis. Ecusson transversal, triangulaire. Elytres ovales, arrondis ensemble au sommet, dentés aux épaules, stries suturales et humérales bien marquées, effacées, la première à la base, la 2.^{me} vers le sommet; marges latérales largement explanées.

Sumatra (Si-Rambé). E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gênes.

87. **Laemophloeus bimaculosus**, n. sp. — *Oblongus, vix convexus, nitidus, glaber; capite prothoraceque rufis; elytris testaceis nigro transversim maculatis; articulis 2.º et 3.º antennarum subaequalibus,*

clava tri-articulata ; capite subdepresso, antice tri-sinuato ; prothorace transverso, parce punctato, utrinque striato, lateribus arcuatis ; scutello transverso, triangulari ; elytris ovatis, ad apicem separatim rotundatis, quinque striatis, lateribus vix plicatis. — Long. 1 mill. $\frac{1}{2}$ à 2 mill.

Oblong, à peine convexe, brillant, glabre, tête et prothorax roux, élytres testacés, chacun avec une large tache transversale noire. Antennes assez allongées, deuxième et troisième articles subégaux, articles de la massue non serrés, dernier terminé par un bouton saillant plus long que large. Tête déprimée, éparsément pointillée, légèrement impressionnée à la base des antennes, bord antérieur tri-sinué, finement rebordé ; labre très découvert. Prothorax une fois et demie aussi large que long, un peu rétréci à la base, éparsément ponctué, strié de chaque côté, marges latérales avec une forte impression le long de la strie discoidale ; bords arqués, à peine redressés à la base. Ecusson transversal triangulaire. Elytres ovales, arrondis séparément au sommet, à peine repliés sur les côtés, chacun avec six stries discoidales, fines effacées au sommet, intervalles avec quelques points fins disposés en lignes.

Engano (Malaconni), Juillet. E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gênes.

88. *Laemophloeus glabriculus*, n. sp. — *Elongatus*, postice attenuatus, convexus, nitidus, glaber, testaceus ; capite prothoraceque subrufo-testaceis ; antennis sat incrassatis, articulis omnibus subquadratis, capite convexo, parce punctato, antice truncato ; prothorace basin versus angustato, utrinque bi-striato ; lateribus subrectis, dorso parce punctato, utrinque in longitudinem subfoveolato, scutello transverso, haud triangulari ; elytris ad apicem separatim rotundatis, angulis apicalibus extus reflexis, disco tri-striato, lateribus plicatis. — Long. 1 mill. $\frac{1}{2}$.

Allongé, atténué postérieurement, convexe, brillant, glabre, testacé. Antennes plus longues que la tête et le prothorax ensemble, un peu épaissies, 2.^{me} et 3.^{me} articles subégaux, tous les articles sensiblement aussi longs que larges. Tête convexe, tronquée en avant, éparsément ponctué, transversalement subimpressionnée

entre les bases des antennes. Prothorax environ aussi long que large au bord antérieur, rétréci à la base, bi-strié de chaque côté, disque éparsément ponctué, longitudinalement subimpressionné de chaque côté, relevé le long de la base entre les impressions. Ecusson transversal, subrectangulaire. Elytres environ deux fois aussi long que le prothorax, arrondis séparément au sommet; angles apicaux externes réfléchis latéralement; disque tri-strié, marges latérales repliées, carenées au sommet.

Sumatra (Deli). Collection Grouvelle. Engano (Malaconni). E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gênes.

89. **Pediacus ater**, n. sp. — *Oblongo-elongatus, depressus, nitidus, glaber, niger, capite, lateribus prothoracis pedibusque rufo-fuscis; articulis 6.º et 8.º antennarum constrictis; capite prothoraceque dense punctatis, hoc transverso, lateribus obtuse tri-dentatis; elytris dense irregulariterque punctatis, stria suturali antice abbreviata.* — Long. 4 mill. $\frac{1}{2}$.

Allongé, oblong, déprimé, brillant, glabre, noir, tête et pattes roux de poix. Sixième et huitième articles des antennes plus étroits que les cinquième et septième; premier et deuxième articles de la massue transversaux, troisième plus étroit que le deuxième. Tête densément ponctuée, déprimée en avant à partir de la naissance des antennes. Prothorax transversal, hexagonal, densément ponctué, marges latérales concaves, lisses, bords obtusément dentés. Ponctuation des élytres irrégulière, plus ou moins serrée; strie suturale atténuée à la base.

Sumatra (Si-Rambé). E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gênes.

90. **Silvanus granosus**, n. sp. — *Elongatus, parallelus, subdepressus, opacus, castaneus; antennis haud elongatis, 1.º et 2.º articulis clavæ ad apicem truncatis; oculis ad angulos posticos capitis sitis; prothorace subelongato, basin versus angustato, angulis anticis dentatis, subproductis, scutello transverso, pentagonali; elytris punctato-striatis, intervallis alternis subelevatis.* — Long. 3 mill. $\frac{1}{2}$.

Allongé, parallèle, presque déprimé, opaque, marron clair, antennes peu allongées, articles 1 à 5 un peu plus longs que

larges, sommet des premiers et deuxièmes articles de la massue tronqué. Tête triangulaire, tronquée au sommet, yeux placés aux angles postérieurs. Prothorax à peine plus large que la tête au sommet, un peu plus long que large, rétréci à la base, angles antérieurs dentés, aigus, à peine saillants, bord antérieur sinué contre les angles, bords latéraux finement crénelés, presque droits, assez brusquement sinués contre la base; disque obsolètement bi-impressionné. Ecusson transversal, pentagonal. Elytres environ trois fois aussi longs que larges ensemble, ponctués-striés, intervalles alternes légèrement élevés.

Sumatra (Deli). Collection Grouvelle. Engano (Bua-Bua). E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gênes.

91. *Silvanus levicollis*, n. sp. — *Elongatus, parallelus, vix convexus, nitidus, tenue pubescens; antennis brevibus, articulis 1-3 subelongatis; capite prothoraceque parce punctulatis, angulis posticis capitis acutis, temporibus prope nullis; prothorace elongato, basin versus angustato, angulis anticis acutis, haud productis, lateribus crenulatis, ad angulos posticos emarginatis, disco in longitudinem bi-foveolato; elytris punctato-striatis.* — Long. 3 mill.

Allongé, parallèle, à peine pubescent, brillant, finement pubescent. Antennes courtes, articles 1 à 3 un peu allongé, 6.^{me} et 8.^{me} un peu plus étroits que 5.^{me} et 7.^{me}. Tête et prothorax éparsément et très finement ponctués; yeux très développés atteignant presque les angles postérieurs de la tête, ceux-ci aigus. Prothorax un peu plus large au sommet que la tête, plus long que large, rétréci à la base, bord antérieur sinué échancré de chaque côté vers les angles antérieurs, ceux-ci aigus non saillants, bords latéraux finement crénelés, presque droits échancrés aux angles postérieurs. Ecusson transversal, pentagonal. Elytres de la largeur du prothorax au sommet, environ deux fois et demie aussi longs que larges, ponctués-striés, stries presque géminées.

Sumatra (Deli). Collection Grouvelle. Engano (Malaconni). E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gênes.

92. *Silvanus cribricollis*, n. sp. — *S. levicollis simillimus, sed capite prothoraceque dense punctatis et angulis anticis prothoracis productis.* — Long. 3 mill. à 2 mill. $\frac{3}{4}$.

Très voisin du *S. levicollis* Grouv. mais s'en séparant par la ponctuation de son prothorax beaucoup plus forte et beaucoup plus dense presque rugueuse surtout sur les côtés et par la forme des angles antérieurs du prothorax qui sont non seulement aigus, mais de plus saillants.

Sumatra (Deli). Collection Grouvelle. Engano (Bua-Bua, Malacconi). E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gènes.

93. **Silvanus tenuicollis**, n. sp. — *Oblongus, convexus, opacus, tenuis pubescens, castaneus; articulis antennarum elongatis; capite triangulari, angulis posticis rotundatis, oculis productis; prothorace subcylindrico; elytris prothorace latioribus, punctato-striatis.* — Long. 2 mill. $\frac{1}{2}$.

Oblong, convexe, opaque, garni d'une très courte pubescence, brun ferrugineux. Antennes dépassant la base du prothorax, articles 1 à 8 plus longs que larges, massue formée d'articles non serrés. Tête et prothorax densément ponctués. Tête triangulaire, yeux saillants, angles postérieurs arrondis. Prothorax un peu plus étroit que la tête, subcylindrique, légèrement rétréci dans la partie basilaire, une fois et un tiers aussi long que large. Ecusson transversal, pentagonal. Elytres deux fois plus larges que le prothorax, environ deux fois aussi longs que larges, ponctués-striés.

Sumatra (Si-Rambé). E. Modigliani. Collection du Musée Civique de Gènes.

THORICTIDAE.

94. **Thorictus Feae**, n. sp. — *Oblongus, convexus, fusco-castaneus, glaber, parce punctatus, humeris haud fasciculatis.* — Long. 1 mill. $\frac{1}{3}$.

Oblong, convexe, roux sombre, glabre, éparsément et assez fortement ponctué sauf sur la déclivité des élytres. Prothorax transversal; rebord marginal des côtés arrêté un peu avant les angles postérieurs, base rebordée sans aucune impression. Elytres environ une fois et demie aussi longs que larges ensemble, sans pubescence aux épaules et sans impression à la base.

Birmanie (Mandalay). L. Fea. Collection du Musée Civique de Gènes.